

タフメイトゴールド

〔使用上の注意〕

相談すること

1.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること／皮膚：発疹／消化器：胃部不快感、下痢 2.しばらく服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

〔成分・分量〕 1日量1本(50mL)中

チアミン硝酸物10mg、リボフラビンリン酸エステルナトリウム5mg、ピリドキシン塩酸塩10mg、ニコチン酸アミド20mg、無水カフェイン50mg、タウリン1500mg、L-アルギニン塩酸塩50mg、ローヤルゼリー抽出液200mg(ローヤルゼリー200mgに相当)、ゴオウ抽出液50 μ L(ゴオウ1mgに相当)、ロクジョウチンキ50 μ L(ロクジョウ14.3mgに相当)、イカリソウ流エキス0.15mL(イカリソウ150mgに相当)、ニンジンエキス55mg(ニンジン610mgに相当)
添加物：白糖、D-ソルビトール、dl-リンゴ酸、クエン酸Na水和物、クエン酸水和物、安息香酸Na、カラメル、マクロゴール、メタリン酸Na、エタノール、香料、エチルパニコリン、パニコリン、プロピレングリコール〔(アルコール0.35mL以下)〕
●本剤に配合されているリボフラビンリン酸エステルナトリウムにより、尿が黄色になることがある。

AL04

副作用被害救済制度 電話：0120-149-931

滋養強壮・栄養補給

タフメイトゴールド

GOLD

TAFU-MATE

ローヤルゼリー

ニンジン

ロクジョウ／ゴオウ

ビタミンB群配合

第2類医薬品

〔効能・効果〕 滋養強壮、虚弱体質、肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前産後などの場合の栄養補給

〔用法・用量〕 成人(15歳以上)

1日1回1本(50mL)を服用する。●用法及び用量を厳守すること。●本剤は、まれに沈殿を生じることがあります。よく振って服用すること。

〔保管及び取扱い上の注意〕

(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。(2)小児の手の届かない所に保管すること。(3)他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる。)(4)使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。(5)加温、冷凍はさけること。

〈お客様相談室〉06-6203-5151
受付時間 10:00~17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元 田村薬品工業株式会社
奈良県御所市西寺田50