

イソビタンV²

成分・分量 1日量1本(100mL)中
チアミン硝酸物10mg、リボフラビン
リン酸エステルナトリウム3mg、ピリ
ドキシン塩酸塩50mg、ニコチン酸ア
ミド30mg、無水カフェイン50mg、L
-アルギニン塩酸塩40mg、L-アスパ
ラギン酸マグネシウム・カリウム
1000mg、ローヤルゼリー50mg
添加物：白糖、D-ソルビトール、DL-
リンゴ酸、クエン酸水和物、安息香酸
Na、エデト酸Ca/2Na、香料、エタ
ノール、バニリン

●本剤に配合されているリボフラビン
リン酸エステルナトリウムにより、
尿が黄色になることがある。

用法・用量 成人(15歳以上)1日
1回1本(100mL)を服用する。

●用法及び用量を厳守すること。
●本剤は、まれに沈殿を生じることが
ある。よく振って服用すること。

効能・効果 滋養強壮、虚弱体質、
肉体疲労・病中病後・胃腸障害・栄養障
害・発熱性消耗性疾患・産前産後など
の場合の栄養補給

副作用被害救済制度
電話：0120-149-931 KL05
金属：キャップ ガラス：瓶
(お客様相談室)06-6203-5151
受付時間10:00~17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元

田村薬品工業株式会社
奈良県御所市西寺田50

100mL

肉体疲労時の栄養補給
ローヤルゼリー配合

イソビタン
V²

第3類医薬品

使用上の注意

相談すること 1.服用後、次の症状があら
われた場合は副作用の可能性があるので、
直ちに服用を中止し、この製品を持って医
師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

| 関係部位 | 症状 |
|------|----------|
| 皮膚 | 発疹 |
| 消化器 | 胃部不快感、下痢 |

2.しばらく服用しても症状がよくならない場
合は服用を中止
し、この製品を
持って医師、薬剤
師又は登録販売
者に相談すること

保管及び取扱 い上の注意

(1)直射日光の当
たらぬ涼しい所
に保管すること。
(2)小児の手の届
かない所に保管す
ること。(3)他の
容器に入れ替えな
いこと(誤用の原
因になったり品質
が変わる)。(4)使
用期限を過ぎた
製品は服用しない
こと。(5)加湿、冷
凍はさけること。



使用期限

製造番号