

【使用上の注意】

相談すること

次の場合は、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師又は薬剤師に相談すること

- 本剤の服用により、胃部不快感、下痢、発疹等の症状があらわれた場合。
- しばらく服用しても症状がよくなりません。

成分・分量

1本30mL中

チアミン硝化物…10mg、
ピリドキシン塩酸塩…
20mg、ニコチン酸アミ
ド…30mg、無水カフェ
イン…50mg、タウリン
…1000mg、ニンジン
エキス…55mg(ニンジ
ンとして610mg)、イン
ヨウカク流エキス…150
μL(インヨウカクとして
150mg)、クラテグス
エキス…30mg(クラテ
グスとして300mg)
添加物：クエン酸水和
物、DL-リンゴ酸、白糖、
D-ソルビトール、安息香
酸Na、エタノール、香料

用法・用量

成人(15歳以上)1日1回
1本(30mL)を服用する。
●内服のみに使用す
ること。●用法及び用量を
厳守すること。●本剤は、
まれに沈殿を生じることが
あります。よく振って
服用すること。

滋養強壯 虚弱体質

イソビタン^W 内服液II

第2類医薬品

発熱性消耗性疾患時の
栄養補給

効能・効果

滋養強壯、虚弱体質、肉体疲労・
病中病後・胃腸障害・栄養障害・
発熱性消耗性疾患・産前産後
などの場合の栄養補給

保管及び取扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない涼しい所
に保管すること。(2) 小児の手の届
かない所に保管すること。(3) 他の容
器に入れ替えないこと。(誤用の原因
になったり品質が変わる。) (4) 使用
期限を過ぎた製品は服用しないこ
と。

30mL ¥420(税込)

製造販売元

田村薬品工業株式会社

奈良県御所市西寺田50

副作用被害救済制度

電話：0120-149-931

111720

FSF101



アンブル：PP

ラベル：PET

使用
期限
製造
番号