

【成分・分量】1日量1本(100mL)中
チアミン硝化物10mg、リボフラビンリン酸エステルナトリウム3mg、ピリドキシン塩酸塩50mg、ニコチン酸アミド20mg、無水カフェイン50mg、L-アルギニン塩酸塩40mg、タウリン3000mg、ローヤルゼリー抽出液200mg(ローヤルゼリー200mgに相当)添加物:白糖、D-ソルビトール、DL-リンゴ酸、クエン酸水和物、安息香酸Na、カラメル、マクロゴール、メタリン酸Na、香料、エタノール、プロピレングリコール、バニリン「(アルコール0.3mL以下)」●本剤に配合されているリボフラビンリン酸エステルナトリウムにより、尿が黄色になることがある。

【用法・用量】

成人(15歳以上)1日1回1本(100mL)を服用する。

- 用法及び用量を厳守すること。
- 本剤は、まれに沈殿を生じることがある。よく振って服用すること。

製造販売元 TL07

田村薬品工業株式会社

奈良県御所市西寺田50

〈お客様相談室〉06-6203-5151
受付時間10:00~17:00(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度 ガラス:瓶
電話:0120-149-931 金属:キャップ

滋養強壮・虚弱体質 肉体疲労時の栄養補給に

元気に感謝!

ローヤルゼリー

タウリン
3000mg
配合

L-アルギニン

3000

イソビタンZ3000

第3類医薬品

100mL

販売名:イソビタンZ3000

【使用上の注意】**相談すること**

1. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹
消化器	胃部不快感、下痢

を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【効能・効果】滋養強壮、虚弱体質、肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前産後などの場合の栄養補給

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。(2) 小児の手の届かない所に保管すること。(3) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)。(4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。(5) 加温、冷凍はしないこと。(6) 長期間の低温保管等により、まれに結晶を生じることがある。

2. しばらく服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この製品



使用期限

製造番号