

【成分・分量】1日量1本(100mL)中  
チアミン硝化物10mg、リポフラビ  
ンリン酸エステルナトリウム3mg、  
ピリドキシン塩酸塩50mg、ニコチ  
ン酸アミド20mg、無水カフェイン  
50mg、タウリン3000mg、L-アル  
ギニン塩酸塩40mg、ゴオウ抽出液  
50 $\mu$ L(ゴオウ1mgに相当)、ローヤ  
ルゼリー抽出液300mg(ローヤルゼ  
リー300mgに相当) 添加物：白糖、  
D-ソルビトール、安息香酸Na、カラ  
メル、クエン酸水和物、DL-リンゴ  
酸、メタリン酸Na、マクロゴール、  
エタノール、香料、バニリン、プロピ  
レングリコール「(アルコール0.4mL以下)」  
●本剤に配合されているリポフラビ  
ンリン酸エステルナトリウムにより、  
尿が黄色になることがある。

【用法・用量】

成人(15歳以上)1日1回1本  
(100mL)を服用する。

●用法・用量を厳守すること。

●本剤は、まれに沈殿を生じることが  
ある。よく振って服用すること。

製造販売元 TL06

田村薬品工業株式会社

奈良県御所市西寺田50  
(お客様相談室) 06-6203-5151  
受付時間10:00~17:00(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度 ガラス:瓶  
電話:0120-149-931 金属:キャップ

滋養強壮・虚弱体質  
肉体疲労時の栄養補給に

元気に感謝!

ローヤルゼリー  
300mg  
配合

タウリン  
3000mg  
配合

牛黄  
(ゴオウ)  
1mg  
配合

3000  
300  
1

イソビタンZ3000II

第3類医薬品

100mL

販売名：イソビタンZ3000II

〔使用上の注意〕 相談すること

1.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること/皮膚：発疹/消化器：胃部不快感、下痢 2.しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【効能・効果】滋養強壮、虚弱体質、肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前産後などの場合の栄養補給

【保管及び取扱い上の注意】

(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。(2)小児の手の届かない所に保管すること。(3)他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)。(4)使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。(5)加温、冷凍はしないこと。(6)長期間の低温保管等により、まれに結晶を生じることがある。



使用期限

製造番号