

## 新インパラα内服液

### 【使用上の注意】

**相談すること** 1.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること/皮膚:発疹/消化器:胃部不快感、下痢2.しばらく服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

**【成分・分量】**1日量1本(30mL)中  
チアミン塩化物 10mg、リボフラビンリン酸エステルナトリウム 3mg、ピリドキシン塩酸塩 5mg、ニコチン酸アミド 30mg、無水カフェイン 50mg、タウリン 1000mg、L-アルギニン塩酸塩 40mg、塩化カルニチン 100mg、ローヤルゼリー抽出液 50mg(ローヤルゼリー50mgに相当)、ゴオウ抽出液 100μL(ゴオウ2mgに相当)添加物:白糖、D-ソルビトール、ハチミツ、安息香酸Na、マクロゴール、カラメル、クエン酸水和物、β-リジン酸、メタリン酸Na、香料、エチルパニリン、トコフェロール、パニリン、プロピレングリコール〔アルコール0.2mL以下〕

●本剤に配合されているリボフラビンリン酸エステルナトリウムにより、尿が黄色になることがあります。

発売元 30mL ¥300+税

布電株式会社

西宮市今津二葉町3番6号

製造販売元

田村薬品工業株式会社

奈良県御所市西寺田50

06-6203-5151

ゴオウ・ローヤルゼリー  
タウリン配合

滋養強壯・虚弱体質

新インパラα  
内服液

牛黄 ローヤルゼリー

30mL

タウリン

第3類  
医薬品



### 【効能・効果】

滋養強壯、虚弱体質、肉体疲労・病中病後・腎臓障害・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前産後などの場合の栄養補給

### 【用法・用量】

成人(15歳以上)1日1回1本(30mL)を服用する。●用法及び用量を厳守すること。●本剤は、まれに沈澱を生じることがあります。よく振って服用してください。

### 【保管及び取扱い上の注意】

(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。(2)小児の手の届かない所に保管すること。(3)他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる。)(4)使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。(5)加温、冷凍はさけること。

ガラス:瓶 金属:キャップ

副作用被害救済制度

電話:0120-149-931

使用  
期限  
製造  
番号