

りきせい
販売名：力精SⅡ

成分・分量 1日量1本(50mL)中
チアミン硝酸物…10mg、リボフラビンリン
酸エステルナトリウム…3mg、ピリドキシン
塩酸塩…5mg、ニコチン酸アミド…1
2mg、無水カフェイン…50mg、シクロ酢
酸ジイソプロピルアミン…30mg、カルニ
チン塩化物…100mg、ゴオウ抽出液…10
0μL(ゴオウ2mgに相当)、ニンジンエキス…
72.1mg(ニンジン800mgに相当)

添加物：白糖、D-ソルビトール、ハチミツ、ク
エン酸Na水和物、クエン酸水和物、DL-リン
ゴ酸、トウガラシチンキ、安息香酸Na、カラメ
ル、エタノール、ポリオキシエチレンポリオキ
シプロピレングリコール、香料、バニリン、プロ
ピレングリコール、エチルパニリン、ミツロ
ウ、グリセリン〔アルコール0.4mL以下〕
●本剤に配合されているリボフラビンリン酸
エステルナトリウムにより、尿が黄色になる
ことがある。

効能・効果

滋養強壮、虚弱体質、肉体疲労・病中病後・胃
腸障害・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前産
後などの場合の栄養補給

副作用被害救済制度 電話：0120-149-931

〈お客様相談室〉06-6203-5151

受付時間 10:00～17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元 田村薬品工業株式会社
奈良県御所市西寺田50

第3類医薬品

力精SⅡ

牛黄・人参配合

50mL

使用上の注意 **相談すること**

1.服用後、次の症状があらわれた場合は副
作用の可能性があるので、直ちに服用を中
止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登
録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮膚	発疹
消化器	胃部不快感、下痢

2.しばらく服用しても症状がよくなる場
合は服用を中止し、この製品を持って医師、
薬剤師又は登録販売者に相談すること

用法・用量

成人(15歳以上)1日1回1本(50mL)を服
用する。●用法・用量を厳守すること。●本
剤は、まれに沈殿を生じることがある。よく
振って服用すること。

保管及び取扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管
すること。(2)小児の手の届かない所に保管
すること。(3)他の容器に入れ替えないこと
(誤用の原因になったり品質が変わる)。
(4)使用期限を過ぎた製品は服用しないこ
と。(5)加温、冷凍はさけること。

ガラス：瓶 金属：キャップ KL01

使用期限 製造番号