

## 【使用上の注意】

### 相談すること

1. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること/皮ふ:発疹/消化器:胃部不快感、下痢
2. しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

### 成分・分量


1日量1本(30mL)中  
チアミン硝酸物…10mg、ピリドキシン塩酸塩…20mg、ニコチン酸アミド…30mg、無水カフェイン…50mg、タウリン…1000mg、インヨウカク流エキス…0.15mL(インヨウカクとして150mg)、オウギエキス…33.3mg(オウギとして200mg)、ニンジンエキス…55mg(ニンジンとして610mg)添加物:白糖、D-ソルビトール、クエン酸Na水和物、クエン酸水和物、安息香酸Na、カラメル、エデト酸Ca/2Na、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール、pH調節剤、エタノール、香料「(アルコール0.1mL以下)」

 アンプル:PP  
ラベル:PET

## 滋養強壮・虚弱体質



## 発熱性消耗性疾患時の 栄養補給



第2類医薬品

30mL

## 用法・用量

成人(15歳以上)1日1回1本(30mL)を服用する。●内服にのみ使用すること。●用法及び用量を厳守すること。●本剤は、まれに沈殿を生じることがある。よく振って服用すること。

## 効能・効果

滋養強壮、虚弱体質、肉体疲労・病中病後・胃腸障害・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前産後などの場合の栄養補給

## 保管及び取扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。(2) 小児の手の届かない所に保管すること。(3) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)。(4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。

30mL

製造販売元

田村薬品工業株式会社

奈良県御所市西寺田50

<お客様相談室>06-6203-5151

受付時間 10:00~17:00

(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度 111830  
電話:0120-149-931 FSFO01

使用  
期限  
製造  
番号

