

**【使用上の注意】【相談すること】**

品目番号 22-85-333

1.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること 皮膚：発疹／消化器：胃部不快感 2.服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること 下痢 3.しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

**【成分・分量】** 1日量1本(30mL)中

リポフラビン(ビタミンB<sub>2</sub>) 3mg、ニコチン酸アミド50mg、無水カフェイン50mg、ゴウチンキ(原生薬換算量2mg) 0.2mL、ハンビチンキ(原生薬換算量75mg) 0.375mL、インヨウカクエキス(原生薬換算量450mg) 45mg、オウセイ流エキス(原生薬換算量300mg) 0.3mL 添加物：DL-リンゴ酸、白糖、D-ソルビトール、安息香酸Na、パラベン、プロピレングリコール、ポリオキシエチレンポリオキシシロピレングリコール、カラメル、pH調整剤、香料、エタノール、ミツロウ、トメントール(アルコール0.4mL以下)

●本剤に配合されているビタミンB<sub>2</sub>により、尿が黄色くなることがある。

**【効能・効果】**●滋養強壯●虚弱体質●肉体疲労●病中病後・胃腸障害・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給

**【用法・用量】**成人(15歳以上)1日1回1本(30mL)を服用する。15歳未満は服用しないこと。●用法及び用量を厳守すること。●生薬成分を含むため沈殿を生じることがあるので、よく振って服用すること。●キャップは矢印→の方向にまわして開封すること。

**【保管及び取扱い上の注意】**1.直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。2.小児の手の届かない所に保管すること。3.他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる。)。4.使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。

東亜薬品(株) お客様くすり相談室  
電話：076-478-5580  
(9:00～16:00/土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度 1JC  
電話：0120-149-931 05

第2類  
医薬品

発熱性消耗性疾患

リキド-エスゴールド

滋養強壯・肉体疲労〈内服液〉

生薬配合

〈ゴウ・インヨウカク・ハンビ・オウセイ配合〉

30mL

製造販売元 **TOA** 東亜薬品株式会社  
富山県富山市水橋徳見277番10

ガラス：瓶 金属：キャップ

使用  
期限

製造  
番号

