

## 効能・効果

滋養強壮、虚弱体質、肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給

### ⚠ 使用上の注意

#### 相談すること

1. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

2. しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

#### 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。  
(2) 小児の手の届かない所に保管してください。  
(3) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

製造販売元



合名会社 東宝製薬

岐阜市沖ノ橋町3丁目45番地

お客様相談窓口 ☎ 058-251-6668

P-16A-26

4  
955103 016013

# 肝臓加水分解物 ゴオウ オロチン酸配合

## タミンαA

### 滋養強壮、 肉体疲労時の 栄養補給

#### 第3類医薬品

50mL

## 成分・分量 1日量(1瓶・50mL)中

肝臓加水分解物 ……………200mg  
ゴオウチンキ  
(原生薬換算量:1mg) ……………0.1mL  
クコシ流エキス  
(原生薬換算量:500mg) ……………0.5mL  
タウリン ……………2,000mg  
オロチン酸 ……………60mg  
リボフラビン(ビタミンB2) ……………4mg  
ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6) ……20mg  
無水カフェイン ……………50mg  
(アルコール0.2mL以下)

添加物としてカンゾウエキス、白糖、クエン酸水和物、カラメル、安息香酸ナトリウム、香料を含有します。

### 用法・用量

成人(15歳以上) 1回1瓶(50mL)を1日1回服用する。

※15歳未満は服用しないでください。

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

ガラス：瓶 金属：キャップ

製造番号

使用期限