

使用上の注意

(相談すること)1.服薬後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持つて医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。○皮膚:発疹・発赤、かゆみ 2.じんぐく服用しての症状がよくならない場合は服用を中心し、この製品を持つて医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

保管及び取扱いの注意

1.直射日光の当たらない涼気の少ない清潔な所に保管すること。2.乳児の手の届かない所に保管すること。3.他の容器に入れ替えないこと。(原用の原因になつたり品質が変わること) 4.使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。

用法・用量

成人(15才以上)1回本(100ml)を1日1回服用してください。
●定められた用法・用量を厳守すること。●15才未満は服用しないこと。●本剤は生葉成分を含むため、まれに沙殿を生じることがあります。薬効には変わりありません。よく振ってから服用してください。

製造販売元: 東和製薬株式会社
和歌山県紀の川市高吉町丸橋1229番地
郵便元: 埼玉県さいたま市大宮区桜木町4丁目383番地
お問い合わせ先(富士薬品) ☎ 048-648-1118
副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931
ガラス・瓶・金属・キャップ 1BK

がんばるあなたの強い味方

リツチミン[®]

スーパーEX

滋養強壮、虚弱体質、肉体疲労時の栄養補給

人参・淫羊藿 タウリン3000mg

100mL

●富士薬品 第2類医薬品

リツチミンスーパーEX

効能・効果

滋養強壮、虚弱体質、肉体疲労、病中病後、食欲不振、栄養障害、発熱性消耗性疾患、産前産後などの場合の栄養補給

使用期限

Lot.

成分・分量 <1日量1本(100mL)中>

チアミン硝化物(ビタミンB1)10mg、リボフライシン(ビタミンB2)5mg、ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6)10mg、アセチルセト酸ミド50mg、無水カフェイン50mg、イノシトール100mg、タウリン3,000mg、L-アスパラギン酸ナトリウム150mg、L-アルギニン塩酸塩300mg、イカリソウエキス100mg(原生薬換算量:500mg)、ニンジンエキス90mg(原生薬換算量:603mg)
添加物:白糖、クエン酸水和物、DL-リジン酸、キサンタンガム、ポリキシリエチレンポリオキシプロピレングリコール、安息香酸ナトリウム、カラメル、甘草、グリセリル、含有(アルコール0.2mL以上)

●本剤に配合されているビタミンB3により、尿が黄色くなることがあります。