

服用に際しては、この説明文をよく読むこと。

ピラックスD (滋養強壯薬)

使用上の注意 [相談すること] 1.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること
/ 皮膚：発疹 / 消化器：胃部不快感・下痢
2.しばらく服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

成分・分量 1日量(100mL)中
チアミン硝酸物(ビタミンB₁) 10mg、リボフラビンリン酸エステルナトリウム(ビタミンB₂) 5mg、ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB₆) 25mg、ニコチン酸アミド30mg、無水カフェイン50mg、タウリン1,200mg、ローヤルゼリー100mg、ニンジンエキス40.3mg(原生薬換算量600mg) 添加物：液糖、D-ソルビトール、pH調節剤(クエン酸)、安息香酸Na、香料(バニリン、プロピレングリコール、エタノール) ●ビタミンB₂により尿が黄色くなることがある。

効能・効果 ○滋養強壯○虚弱体質○肉体疲労・病中病後・胃腸障害・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給
用法・用量 成人(15才以上) 1日1回、1びん(100mL)を服用すること。

●用法・用量を守ること。

副作用被害救済制度
0120-149-931

タウリン・ニンジン
ローヤルゼリー配合

ピラックス
D

滋養強壯・虚弱体質

第3類医薬品

保管および取扱い上の注意
(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。
(2)小児の手のとどかない所に保管すること。(3)他の容器に入れかえないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)(4)期限を過ぎた製品は服用しないこと。
(5)生薬を含むため、まれに混濁を生じることがありますが、服用には支障はありません。

常盤薬品工業株式会社
本社 神戸市中央区港島中町6-13-1
製造販売元 三重県伊賀市白檜字永谷2604-5

お問い合わせは
0120-875-710まで

009322
AL1808