

服用に際しては、この説明文をよく読むこと。

トップグロンG3000DX II (滋養強壮薬)
使用上の注意(相談すること) 1.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること/皮ふ：発疹/消化器：吐き気・嘔吐・胃部不快感 2.服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続または増強がみられた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること/軟便、下痢 3.しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

成分・分量 1日量(100mL)中 オウギ流エキス0.3mL(原生薬換算量300mg)、ニンジンエキス40.3mg(原生薬換算量600mg)、インヨウカク流エキス0.3mL(原生薬換算量300mg)、ローヤルゼリー50mg、アスパラギン酸カリウム・マグネシウム等量混合物200mg、乳酸カルシウム水和物310mg、タウリン3,000mg、ベンフォチアミン(ビタミンB1誘導体)10mg、リボフラビンリン酸エステルナトリウム(ビタミンB2)12mg、ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6)50mg、ニコチン酸アミド60mg、無水カフェイン50mg 添加物：液糖、D-ソルビトール、クエン酸、pH調節剤、安息香酸Na、香料(バニリン、エチルバニリン、プロピレングリコール、グリセリン、エタノール)●ビタミンB2により尿が黄色くなることがある。

効能・効果 ○滋養強壮○虚弱体質○肉体的疲労・病中病後・胃腸障害・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給

生薬4種類配合

オウギ、インヨウカク、人参、ローヤルゼリー
滋養強壮、肉体的疲労時の栄養補給

トップグロンG 3000DX II タウリン3000mg

乳酸カルシウム水和物、アスパラギン酸K・Mg

有効成分全12種類配合

100mL

常盤薬品
NOEVIR GROUP

第2類
医薬品

用法・用量 成人(15才以上)1日1回、1びん(100mL)を服用すること。●用法・用量を守ること。

保管および取扱い上の注意
(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。(2)小児の手のとどかない所に保管すること。(3)他の容器に入れかえないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)(4)期限を過ぎた製品は服用しないこと。(5)生薬を含むため、まれに混濁を生じることがありますが、服用には支障はありません。

常盤薬品工業株式会社
NOEVIR GROUP

本社 神戸市中央区港島中町6-13-1
製造販売元 三重県伊賀市白檜字永谷2604-5

お問い合わせは
0120-875-710まで

副作用被害救済制度
0120-149-931

100mL 300円(税別)

金属：キャップ
ガラス：びん

009382
ALE903

配置期限

製造番号

