

服用に際しては、この説明文をよく読むこと。

ネオグロンビター内服液α (滋養強壮薬)

使用上の注意【相関すること】1.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること/皮膚:発疹/消化器:胃部不快感/下痢/2.しばらく服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること/成分量:1日量(30mL)
中 チアミン硝化物(ビタミンB₁)10mg、リボフラビンリン酸エステルナトリウム(ビタミンB₂)5mg、ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB₆)25mg、ニコチン酸アミド30mg、無水カフェイン50mg、タウリン1,000mg、L-リシン塩酸塩100mg、ロクシウウチンキ0.1mL(原生薬換算量28.6mg)、イカリノウ流工キス0.3mL(原生薬換算量300mg)、サンヤク流工キス0.2mL(原生薬換算量200mg)、クコン流工キス0.1mL(原生薬換算量100mg)
添加物:pH調節剤(クエン酸)、安息香酸Na、パラベン、ポピドン、アセスルファミンK、スクラロース、L-グルタミン酸Na、液糖、D-ソルビトール、香料(エタノール、パニリン、プロピレングリコール)(アルコール0.3mL以下)

発熱性消耗性疾患時の
栄養補給

ネオグロンビター
内服液

α

滋養強壮・虚弱体質



第2類医薬品 30mL

常盤薬品

NOEVIR GROUP

●ビタミンB₂により尿が黄色くなる
ことがある。効能・効果 ○滋
養強壮 ○虚弱体質 ○肉体的疲
病中病後・胃腸障害・栄養障害・発
熱性消耗性疾患・妊娠授乳期など
の場合の栄養補給 用法・用量 成
人(15才以上)1日1回、1本(30mL)
を服用すること。<用法・用量に
関連する注意>(1)内服にのみ使用
すること。(2)用法・用量を守るこ
と。(3)服用時にはアンプルの頸部
を折り、添付のストローで吸飲す
ること。保管および取扱い上の注意
(1)直射日光の当たらない涼しい所
に保管すること。(2)小児の手のと
どかない所に保管すること。(3)他の
容器に入れかえないこと。(服用の原
因になつたり品質が変わる。)(4)
期限を過ぎた製品は服用しないこ
と。(5)生薬を含むため、まれに混濁
を生じることがありますが、服用に
は支障はありません。

常盤薬品工業株式会社
NOEVIR GROUP

本社
神戸市中央区港島中町6-13-1
製造販売元
三重県伊賀市白檜字永谷2604-5
お問い合わせは
0120-875-710まで
副作用被害救済制度
0120-149-931
400円(税別)

FSL801

使用
期限
製造
番号



アンプル:PP
ラベル:PET