

### △【使用上の注意】



#### ■ 相談すること

1. 服用後、次の症状があらわれた場合は直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位：皮膚 症状：発疹・発赤、かゆみ

2. しばらく服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

#### 【効能・効果】

滋養強壮、虚弱体質、肉体疲労・病中病後の体力低下・胃腸障害・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給

#### 【保管および取扱い上の注意】

(1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないでください。(4) 使用期限を過ぎた製品は、服用しないでください。(5) 本剤は、生薬成分を配合しているため、沈殿または浮遊を生じることがありますが、効能・効果にはかわりありません。よく振って服用してください。

製造販売元

日新薬品工業株式会社

滋賀県甲賀市甲賀町田堵野80-1

お問い合わせ先 ☎ 0120-415-688

受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

ガラス・瓶  
金属・キャップ

六年根高麗紅蔘

# 活龍紅

内服液

K A T S U R Y U K O

滋養強壯

栄養補給



## 【販売名】 活龍紅内服液

- コウジンエキス…………… 300mg  
(原生薬換算量：1,440mg)
- オウセイ流エキス…………… 1mL  
(原生薬換算量：1,000mg)
- ジオウ流エキス…………… 1mL  
(原生薬換算量：1,000mg)
- ショウキョウ流エキス…………… 1mL  
(原生薬換算量：1,000mg)
- トチュウ流エキス…………… 0.3mL  
(原生薬換算量：300mg)
- インヨウカク流エキス…………… 0.2mL  
(原生薬換算量：200mg)
- クコシ流エキス…………… 0.2mL  
(原生薬換算量：200mg)
- リボフラビン…………… 5mg
- ピリドキシン塩酸塩…………… 10mg
- ニコチン酸アミド…………… 25mg
- 無水カフェイン…………… 50mg

添加物：精製白糖、D-ソルビトール液、デキストリン、クエン酸水和物、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール、DL-リンゴ酸、プロピレングリコール、香料、安息香酸Na、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、パラベン  
[アルコール含有 0.6mL 以下]

#### 【用法・用量】

成人(15歳以上)1日1回1瓶(50mL)を服用してください。15歳未満は服用しないでください。●用法・用量を厳守してください。

50mL

第2類医薬品

使用期限

製造番号

