

若甦インベリアル内服液α

使用上の注意

相談すること

- 1.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この容器を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
皮膚：発疹・発赤、かゆみ
- 2.しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この容器を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

成分・分量 1瓶(30mL)中

コウジン流エキス 1.0mL(原生薬として1000mg) / コオウチンキ 0.5mL(原生薬として5mg) / ロクジョウ流エキス 0.1mL(原生薬として100mg) / インヨウカク流エキス 0.5mL(原生薬として500mg) / オウギ流エキス 0.5mL(原生薬として500mg) / クコシ流エキス 0.2mL(原生薬として200mg) / ローヤルゼリー 100mg / リボフラビンリン酸エステルナトリウム 5mg / トコフェロール酢酸エステル 5mg / ビリドキシン塩酸塩 5mg / ニコチン酸アミド 20mg / 無水カフェイン 50mg / (アルコール0.9mL以下)

添加物としてクエン酸、クエン酸Na、パラベン、安息香酸Na、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、エタノール、香料、エチルパニコリン、パニコリン、プロピレングリコール、白糖、ハチミツ、DL-リンゴ酸を含有しています

若甦

(じゃっ そう)

インベリアル内服液α

Jacko

Imperial Oral Liquid α

第2類医薬品

30mL

発売元



日邦薬品工業株式会社

東京都渋谷区代々木3-46-16

電話(03)3370-7174(代表)

製造販売元



日東薬品工業株式会社

京都府向日市上植野町南開35-3

副作用被害救済制度の問合せ先

☎ 0120-149-931

*生薬成分のため濁りを生じることがありますので、よく振ってから服用してください。薬効には影響ありません

・本剤に配合されているリボフラビンリン酸エステルナトリウムにより尿が黄色になることがあります

効能・効果

滋養強壮、虚弱体質
肉体疲労・病中病後・胃腸障害・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前産後などの場合の栄養補給

用法・用量

成人(15才以上)1日1回1瓶(30mL)を服用してください

保管及び取扱い上の注意

- (1)服用に際しては、記載事項をよくお読みください
- (2)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください
- (3)小児の手の届かない所に保管してください
- (4)使用期限をすぎた製品は服用しないでください

製造番号

使用期限 B