

第2類医薬品

若鷺インペリアルplus

【成分・分量】成人1日量(4カプセル)中

コウジン乾燥エキス	80mg
(原生薬として800mg)	
ハンピ末	60mg
ロクジョウ末	60mg
インヨウカク乾燥エキス	40mg
(原生薬として320mg)	
オキソアミジン末	100mg
ガラナ乾燥エキス	70mg
(原生薬として525mg)	
ジオウ乾燥エキス	20mg
(原生薬として100mg)	
オウギ乾燥エキス	25mg
(原生薬として200mg)	
トチュウ乾燥エキス	14mg
(原生薬として200mg)	
カショウ乾燥エキス	10mg
(原生薬として100mg)	
チアミン硝酸塩(ビタミンB ₁ 硝酸塩)	20mg
リボフラビン(ビタミンB ₂)	5mg
ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB ₆)	10mg
酢酸d-α-トコフェロール(天然型ビタミンE)	10mg

添加物として、サラシミツロウ、ダイズ油、中鎖脂肪酸トリグリセリド、大豆レシチン、カプセルにコハク化ゼラチン、グリセリン、黒酸化鉄、三二酸化鉄を含有しています

<成分・分量に関連する注意>

本剤に配合されているリボフラビン(ビタミンB₂)により、尿が黄色になることがあります

【用法・用量】

次の量を水又はお湯と一緒に服用してください

年 齢	1 回 服 用 量	1 日 服 用 回 数
成人(15才以上)	2カプセル	2回
15才未満	服用しないこと	

<用法・用量に関連する注意>

(1)定められた用法・用量を厳守してください(2)図のようにカプセルの入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して、裏面アルミ箔を破り、取り出して服用してください(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等、思わぬ事故につながります)

製造番号

使用期限



開 封 口



使用上の注意



相談すること

1. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

2. しばらく服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

服用に際して、この箱の記載事項を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

【効能・効果】

滋養強壮、虚弱体質、肉体的疲労・病中病後・胃腸障害・栄養障害・妊娠授乳期・発熱性消耗性疾患などの場合の栄養補給

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください
- (2)小児の手の届かない所に保管してください
- (3)他の容器に入れ替えないでください(服用の原因になったり品質が変わる)
- (4)使用期限をすぎた製品は服用しないでください

本製品についてのお問合せ先

・お買い求めのお店

・日邦薬品工業株式会社 学術情報室

電話：(03)3370-7174 (代表)

受付時間：午前9:00から午後5:00まで(土、日、祝日を除く)

発売元

日邦薬品工業株式会社

東京都渋谷区代々木3-46-16

<https://www.nippo-yakuhin.jp/>

製造販売元

日東薬品工業株式会社

京都府向日市上植野町南35-3

製品情報はこちらから



第2類医薬品

若鷺

〈じゃっこう〉

インペリアルplus

Jacko Imperial plus

60

カプセル



若鷺

〈じゃっこう〉

インペリアルplus

Jacko Imperial plus

ビタミン含有保健薬

第2類医薬品

60

カプセル