

使用上の注意

相談すること 1.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

皮膚：発疹・発赤／消化器：胃部不快感、下痢

2.しばらく服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

成分・分量（100mL中）

L-イソロイシン94mg、L-ロイシン106mg、
L-フェニルアラニン63mg、L-トレオニン
63mg、L-バリン94mg、L-アルギニン塩酸
塩110mg、L-ヒスチジン塩酸塩105mg、
L-リシン塩酸塩225mg、L-アスパラギン酸
マグネシウム・カリウム200mg、グリシン
310mg、鹿茸チンキ(鹿茸約28.6mgに相
当)0.1mL、ゴオウ抽出液(ゴオウ5mgに相
当)0.5mL、タウリン1,000mg、ピリドキシ
ン塩酸塩7mg、ニコチン酸アミド30mg、カ
フェイン水和物50mg、添加物として白糖、
D-ソルビトール、ブドウ糖果糖液糖、クエン
酸、dl-リンゴ酸、L-グルタミン酸Na、パラベ
ン、安息香酸Na、エタノール、香料、クエン酸
Na、グリセリン、バニリンを含有します。(アル
コール0.8mL以下)

保管及び取扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管
してください。(2)小児の手の届かない所に
保管してください。(3)使用期限を過ぎた製
品は服用しないでください。

☆本剤には、生薬成分が配合されています
ので、わずかに沈殿を生じることがありま
すが、薬効には変わりありません。よく振っ
て服用してください。



疲れたカラダの
エネルギー源

発 売 元 アクシス

株式会社

日野薬品工業株式会社
滋賀県蒲生郡日野町上野田119
電話番号 0748-52-1232

用法・用量

成人(15歳以上)1回
100mL(1瓶)を1日
1回服用してください。
☆定められた用法・用
量をお守りください。

効能・効果

滋養強壮、虚弱体质、
肉体疲労・病中病後・
食欲不振・栄養障害・
発熱性消耗性疾患・妊娠
授乳期などの場合
の栄養補給



副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

使
用
期
限

製
造
番
号

T1405A