



効能・効果
滋養強壮、虚弱
体質、肉体疲労・
病中病後・食欲
不振・栄養障害・
発熱性消耗性
疾患・妊娠授乳
期などの場合の
栄養補給

用法・用量
成人(15歳以上)
1回1瓶(100mL)
を1日1回服用し
てください。

☆定められた用
法・用量をお
守りください。

成分・分量
(1瓶100mL中)

タウリン 3000mg、コウジン流エキス
0.6mL(コウジン600mgに相当)、ローヤ
ルゼリーチンキ-N 200mg(ローヤルゼリー
200mgに相当)、グルコン酸カルシウム
水和物 450mg、チアミン硝化物(ビタミ
ンB1) 10mg、リボフラビンリン酸エステ
ルナトリウム(ビタミンB2) 5mg、ピリドキ
シン塩酸塩(ビタミンB6) 12mg、ニコチ
ン酸アミド 20mg、無水カフェイン 50mg、
塩化カルニチン 100mg
添加物として白糖、D-ソルビトール、ハチミツ、
クエン酸、dL-リンゴ酸、ポリオキシエチレン硬
化ヒマシ油、安息香酸Na、パラベン、香料、
エタノール、プロピレングリコール、パニコリンを
含有します。(アルコール0.6mL以下)

滋養強壮・肉体疲労時の栄養補給に

ナウビタンD[®]
-3000 **第3類医薬品**

1-3000
**紅参・ローヤルゼリー
カルシウム配合**
100mL
ビタミンB1・B2・B6配合

使用上の注意 A1204B


相談すること 次の場合は、直ちに服用
を中止し、この製品を持って医師、薬剤
師又は登録販売者に相談してください。

- (1) 服用後、発疹、胃部不快感、下痢
の症状があらわれた場合
 - (2) しばらく服用しても症状がよくな
らない場合
- 保管及び取扱い上の注意
- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に
保管してください。
 - (2) 小児の手の届かない所に保管して
ください。
 - (3) 使用期限の経過した製品は服用し
ないでください。

☆本剤に配合されているリボフラビンリン
酸エステルナトリウムにより尿が黄色
になることがあります。

☆本剤には、生薬成分が配合されてい
ますので、わずかに混濁、沈澱を生じ
ることがありますが、薬効には変わりあ
りません。よく振って服用してください。

ガラス：瓶
金属：キャップ ®登録商標

製造販売元  **日野薬品工業株式会社**
滋賀県瀬田郡日野町上野田119
☎ 0748-52-1232 受付時間 9:00~17:00
(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

使用
期限

製造
番号