

使用上の注意 相談すること

1.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

皮膚：発疹・発赤／消化器：胃部不快感、下痢
2.しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

用法・用量 成人(15歳以上) 1回1瓶(100mL)を1日1回服用してください。
☆定められた用法・用量をお守りください。

効能・効果 滋養強壮、虚弱体質、肉体的疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給

保管及び取扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。☆本剤に配合されているリボフラビンリン酸エステルナトリウムにより尿が黄色になることがあります。☆本剤には、生薬成分が配合されていますので、わずかに混濁、沈殿を生じることがありますが、薬効には変わりありません。よく振って服用してください。

製造販売元

 日野薬品工業株式会社
滋賀県蒲生郡日野町上野田119
お問い合わせ先 ●お客様相談窓口
電話/0748-52-1232
受付時間9:00～17:00(土、日、祝日を除く)
副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

Now-Vitan D3000



100mL

ナウビタン® D-3000

栄養補給 滋養強壮

タウリン3000mg
紅参
ローヤルゼリー
グルコン酸Ca
塩化カルニチン

第3類医薬品

成分・分量(100mL中)

タウリン 3000mg、コウジン流エキス 0.6mL(コウジン600mgに相当)、ローヤルゼリーチンキー-N 200mg(ローヤルゼリー200mgに相当)、グルコン酸カルシウム水和物 450mg、チアミン硝化物(ビタミンB₁) 10mg、リボフラビンリン酸エステルナトリウム(ビタミンB₂) 5mg、ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB₆) 12mg、ニコチン酸アミド 20mg、無水カフェイン 50mg、塩化カルニチン 100mg
添加物として白糖、D-ソルビトール、ハチミツ、クエン酸、dl-リンゴ酸、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、安息香酸Na、パラベン、香料、エタノール、プロピレングリコール、パニリンを含有します。
(アルコール0.6mL以下)

A 2 4 0 5 A

使用期限

製造番号



ガラス:瓶 金属:キャップ