

滋養に、疲れ・かぜなどの時の栄養補給に

スーパージル・R[®]

10612151

第3類医薬品

成分・分量 1本(30mL)中	タウリン.....1000mg	リボフラビンリン酸エステルナトリウム(V.B2)....4mg
	ゴオウ浸出液(原生薬換算2mg).....0.4mL	イノシトール.....100mg
	ニンジンエキス(原生薬換算333.3mg).....50mg	グルクロノラクトン.....100mg
	クコシ流エキス(原生薬換算100mg).....0.1mL	
	チアミン硝酸物(V.B1).....8mg	

添加物:クエン酸、L-グルタミン酸Na、コハク酸2Na、DL-リンゴ酸、D-ソルビトール液、白糖、安息香酸Na、香料、エタノール、ショ糖脂肪酸エステル(アルコール0.13mL以下)

用法・用量 成人(15才以上)1回1本(30mL)、1日3回食後に服用してください。

効能・効果 滋養強壮、虚弱体質、肉体疲労・病中病後・胃腸障害・栄養障害・
発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給

使用上の注意 **相談すること** 1.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。皮膚：発疹／消化器：胃部不快感、下痢
2.しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

取扱い上の注意 1.小児の手のとどかない所に保管してください。
2.直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
ビタミンB₂が配合されていますので、尿が黄色くなることがあります。



発売元
日邦薬品工業株式会社
東京都渋谷区代々木3-46-16
<http://www.nippo-yakuhin.jp/>
お客様相談室 03-3370-7174(代表)



製造販売元
福井製薬株式会社
大阪市城東区今福東3丁目1番26号

副作用被害救済制度の問合せ先
電話:0120-149-931(フリーダイヤル)