

品名:複方アスパラギン酸塩内服液

【使用上の注意】**相談すること** 1.次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。医師の治療(腎臓疾患で電解質の摂取制限等)を受けている人。2.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるため、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。皮膚:発疹、消化器:胃部不快感、悪心、下痢、便秘等 3.しばらく服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

【保管及び取扱い上の注意】(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管して下さい。(2)小児の手の届かない所に保管して下さい。(3)他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わる。)(4)使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。【用法・用量】成人(15歳以上)1回1瓶(100mL)を1日1回服用する。【用法及び用量に関連する注意】15歳未満の小児は服用しないで下さい。

お客様相談室 0120-53-3451
9:00~17:00
(土、日、祝日、特定休日を除く)
金属:キャップ ガラス:瓶

肉体疲労時の 栄養補給に

アスパラギン酸

カリウム・
マグネシウム

タウリン
1,000
mg

糖類
ゼロ

第3類医薬品

100mL

製造販売元  明治薬品株式会社
富山県富山市三郷6番地

(滋養強壮剤) 14-4-G
【成分・分量】1瓶(100mL)中
L-アスパラギン酸マグネシウム
500mg、L-アスパラギン酸カリウ
ム500mg、タウリン1000mg、パ
ンテノール20mg、無水カフェイン
50mg、イノシトール100mg、ピリ
ドキシン塩酸塩5mg 添加物と
してクエン酸水和物、dl-リンゴ
酸、フマル酸Na、クエン酸ナトリウ
ム水和物、塩化Na、エチルアル
コール、キシリトール、スクラロース、
D-ソルビトール液、安息香酸
Na、ブチルパラベン、カラメル、プ
ロピレングリコール、香料を含有。
(アルコール1.15mL以下)
【効能・効果】滋養強壮、虚弱体
質、肉体疲労・病後の体力低下・
食欲不振・栄養障害・発熱性消耗
性疾患・妊娠授乳期などの場合
の栄養補給

副作用救済制度 ☎0120-149-931

使用期限(上段)
製造番号(下段)

