

服用に際しては、この添付文書を必ず読んでください。
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

滋養強壯薬

第2類医薬品

ちょうじょう こうじん ほうじょう

長城甦腎宝錠

- 長城甦腎宝錠は、「腎」の機能を補うロクジョウ、オウギ、エゾウコギをはじめ12種類の生薬とビタミンB₁を配合した、働き盛りの中高年の方に優れた効果を発揮する滋養強壯薬です。
- 年齢に伴う身体機能の衰えを感じている方におすすめの、中医学の考えに基づいたお薬です。
- 中医学で「腎」とは、泌尿、生殖、内分泌、中枢神経、免疫などの総括的な機能をさし、この機能が衰えた状態を「腎虚」と言います。「腎虚」は疲労、性欲減退、食欲不振などの症状があらわれます。
- 清涼感のある香りがする黒褐色のフィルムコーティング錠です。

⚠️【使用上の注意】



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 薬などによりアレルギー症状やぜんそくを起こしたことがある人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、胃部不快感

3. しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効能・効果】

滋養強壯、虚弱体質、肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前産後などの場合の栄養補給

【用法・用量】

下記1回量を1日3回服用してください。

年齢	1回量
成人(15歳以上)	3錠
15歳未満	服用しないこと

〈用法・用量に関連する注意〉

用法・用量を厳守してください。

【成分・分量】

9錠(成人1日服用量)中に、次の成分を含有します。

成分	分量	成分	分量
ロクジョウ末	250 mg	オウセイ末	250 mg
オウギエキス	32 mg (原生薬として640mgに相当)	トシシエキス	14.29 mg (原生薬として130mgに相当)
エゾウコギエキス	133.33 mg (原生薬として3,000mgに相当)	ジオウエキス	120 mg (原生薬として300mgに相当)
ニンジンエキス	150 mg (原生薬として600mgに相当)	サンシュユ末	50 mg
サンヤク流エキス	0.8 mL (原生薬として800mgに相当)	ブクリョウ末	300 mg
リュウガンニクエキス	90 mg (原生薬として300mgに相当)	チアミン燐化物(ビタミンB ₁)	20 mg
クコシエキス	90.8 mg (原生薬として227mgに相当)		

添加物として、カルナウバロウ、クロスCMC-Na、ケイ酸Al、酸化チタン、ステアリン酸Mg、セルロース、二酸化ケイ素、乳糖、ヒドロキシプロピルスターチ、ヒプロメロース、ポリビニルアルコール・アクリル酸・マタクリル酸メチル共重合体、d-ボルネオール、マクロゴール、黄色4号(タートラジン)、赤色2号、青色2号を含有します。

〈成分・分量に関する注意〉

錠剤の表面が白っぽくなったり、結晶があらわれる場合がありますが、配合成分による物であり、品質には問題ありません。


(裏面へ続く)

【生薬解説】

<p>ロクジョウ[鹿茸]</p> <p>マンシュウジカの雄の幼角で、強壯・強精薬として用いられます。</p> 	<p>オウギ[黄耆]</p> <p>マメ科キバナオウギの根で、強壯薬として用いられます。</p> 	<p>エゾウコギ(刺五加)</p> <p>ウコギ科エゾウコギの根茎で、疲労回復・滋養強壯に用いられます。</p> 
<p>ニンジン[人参]</p> <p>ウコギ科オタネニンジンの根で、疲労回復・胃腸虚弱・食欲不振などに用いられます。</p> 	<p>サンヤク[山薬]</p> <p>ヤマノイモの根茎で、食欲不振・滋養強壯に用いられます。</p> 	<p>リュウガンニク[竜眼肉]</p> <p>ムクロジ科リュウガンの仮種皮で、鎮静・滋養強壯薬として用いられます。</p> 
<p>クコシ[枸杞子]</p> <p>ナス科クコの果実で、強壯薬として用いられます。</p> 	<p>オウセイ[黄精]</p> <p>ユリ科ナルコリリの根茎で、滋養強壯薬として、病後の虚弱症などに用いられます。</p> 	<p>トシシ[菟絲子]</p> <p>ヒルガオ科マメダオシ又はネナシカズラの種子で、強壯薬として用いられます。</p> 
<p>ジオウ[地黄]</p> <p>ゴマンノハグサ科アカヤジオウの根茎で、補血強壯薬として用いられます。</p> 	<p>サンシュユ[山薬萸]</p> <p>ミズキ科サンシュユの果実で、滋養強壯・強精薬として用いられます。</p> 	<p>ブクリョウ[茯苓]</p> <p>サルノコシカケ科マツホドの菌核で、鎮静・利尿薬として広く用いられます。</p> 

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。)
- (4) ビンのフタはよくしめてください。しめ方が不十分ですと湿気などのため変質することがあります。
- (5) 本剤をぬれた手で取り扱わないでください。(水分が錠剤に付くと、表面が一部溶けて変色又は色むらを生じることがあります。)
- (6) ビンの中の詰め物は、輸送中に錠剤が破損するのを防ぐためのものです。開封後は不要となりますので取り除いてください。
- (7) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。



本剤について、何かお気付きの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

日邦薬品工業株式会社 お客様相談室 電話：03-3370-7174(代表)
受付時間 9:00 ~ 17:00(土、日、祝日を除く)