

長城ワコンMゴールド錠

成分・分量 2錠(成人1日服用量)中に、次の成分を含有します。

ゴオウ6mg、ロクジョウ末40mg、オキソアミチン末100mg、イカリソウ乾燥エキス83.33mg、ニクジュヨウ末66.67mg、ジャショウシエキス33.33mg、トシシエキス32.97mg、エゾウコギ乾燥エキス22.22mg、オウギ乾燥エキス37.50mg、ゴミシ乾燥エキス55.56mg、チアミン硝化物10mg、リボフラビン2mg、ピリドキシン塩酸塩10mg、無水カフェイン20mg

添加物として、乳糖、二酸化ケイ素、ケイ酸Al、ヒドロキシプロピルスターチ、セルロース、ポリビニルアルコール・アクリル酸・メタクリル酸メチル共重合体、ヒドロキシプロピルセルロース、クロスCMC-Na、ステアリン酸Mg、ヒプロメロース、マクロゴール、酸化チタン、カルナウバロウ、黄色5号、赤色2号を含有します。

効能・効果 滋養強壯、虚弱体質、肉体疲労・病中病後・胃腸障害・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給

用法・用量 次の1回量を1日1回服用してください。

成人(15歳以上)1回2錠、15歳未満は服用しないでください。

保管及び取扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。)(4)本剤をぬれた手で取り扱わないでください。(水分が錠剤に付くと、表面が一部溶けて変色又は色むらを生じることがあります。)(5)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

販売名:長城ワコンMゴールド錠

第2類医薬品

⚠️使用上の注意

📞相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
(1) 医師の治療を受けている人 (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
皮膚:発疹・発赤、かゆみ 消化器:吐き気・嘔吐、胃部不快感
3. しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

発売元・お問い合わせ先

日邦薬品工業株式会社

東京都渋谷区代々木3丁目46番16号 電話 03-3370-7174(代表)

<https://www.nippo-yakuhin.jp/> 受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

製造 アスゲン製薬株式会社

販売元 岐阜県瑞浪市山田町字小洞2008

副作用被害救済制度

☎0120-149-931