

⚠【使用上の注意】

してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起りやすくなる。)
長期服用しないでください。

相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください。
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 高齢者。
(3) 次の症状のある人。むくみ
(4) 次の診断を受けた人。心臓病、高血圧、腎臓病
2. この場合は、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師又は薬剤師に相談してください。

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合 まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の治療を受けてください。

・偽アルドステロン症：尿量が減少する、頭や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。

(2) 5~6日間服用しても症状がよくならない場合

〔効能〕

- 滋養強化 ○ 虚弱体質
- 肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前産後などの場合の栄養補給

〔用法・用量〕

大人(15歳以上)1回1瓶(30mL)を1日3回服用してください。
服用間隔は4時間以上おいてください。
小児(15歳未満)は服用しないでください。

滋養強化、発熱性消耗性疾患などの栄養補給に

第3類医薬品

レイドミン® 内服液

甘草エキス配合

ビタミン含有保健薬

30mL

細草。味苦温。生川谷。治欝逆傷
遠志。久服。補五。治風。昌赫



名 年。聲。孔。澤。

苦平。生川澤。治風頭。頭眩腫痛。
目欲脫。淚出。皮膚死肌。惡風溼。
癆。久服利血氣。輕身。耐老延年。
府寒熱邪氣。堅筋骨。長肌肉倍力。
金創。愈。解毒。久服輕身延年。
甘草。味甘平。生川谷。治五藏六

〔成分〕 3瓶(90mL)中
カンゾウエキス 900mg
(カンゾウ4.5gに相当)
ビタミンB₂(リボ核酸エステル) 12mg
ビタミンB₆ 45mg
ニコチン酸アミド 60mg
アミノエチルスルホン酸(タウリン) 1500mg
オロト酸コリン 150mg

添加物：白糖、D-ソルビトール、ハチミツ、安息香酸Na、香料、グリセリン、アルコール

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1) 直射日光の当たらない温氣の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
- (4) 本剤は生薬エキスを配合しているため沈殿を生じることがありますが、薬効には変わりありません。よく振って服用してください。

副作用被害救済制度
☎ 0120-149-931

ガラス：瓶
金 属：キャップ

使用期限

製造番号

犬伏製薬株式会社
徳島県板野郡藍住町東中富字東傍示64-6
相談窓口 電話 088-692-2302

4 987430318317