

販売名:アストカル

【効能・効果】●滋養強壮●虚弱体質
●肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養
障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期
などの場合の栄養補給

【用法・用量】成人(15歳以上)1日
1回1瓶(100mL)を服用して
下さい。

●用法・用量を厳守して下さい。

【成分・分量】1日量(100mL)中
チアミン硝酸化物10mg・リポフラビンリン
酸エステルナトリウム5mg・ピリドキ
シン塩酸塩5mg・ニコチン酸アミド
20mg・無水カフェイン50mg・L-リシ
ン塩酸塩100mg・タウリン1000mg・
ローヤルゼリーチンキ50mg(原生薬
換算量50mg)・ジャショウシエキス
20mg(原生薬換算量200mg)

添加物として、クエン酸・DL-リンゴ酸・
白糖・ブドウ糖・D-ソルビトール・ハチ
ミツ・安息香酸Na・パラベン・香料を含
有します。(アルコール0.2mL以下)

●本剤の服用により、尿が黄色くなる
ことがありますが、これは本剤中のリポ
フラビンリン酸エステルナトリウムによ
るもので心配ありません。

副作用救済制度

電話 0120-149-931

協和薬品工業株式会社

岐阜県岐阜市野一色二丁目8番6号

電話 0120-468-771

アストカル®

1000

タウリン 1000mg

ジャショウシ 200mg



第3類医薬品

滋養強壮・肉体疲労時の栄養補給

【使用上の注意】

〔相談すること〕

次の場合は、服用を中止し、この製品を持
って医師、薬剤師又は登録販売者に相談
して下さい。

●しばらく服用しても症状がよくなりな
い場合

【保管及び取り扱い上の注意】

(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管して下
さい。(2)小児の手の届
かない所に保管して下
さい。(3)使用期限を過ぎ
た製品は服用しないで下
さい。(4)本剤は生薬を
配合していますので、ま
れに沈殿又は浮遊を生じ
ることがありますが、薬効
には変わりありませんの
で、よく振ってから服用し
て下さい。

【効能・効果】●滋養強壮●虚弱体質
●肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養
障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期
などの場合の栄養補給

【用法・用量】成人（15歳以上）1日
1回1瓶（100mL）を服用して
下さい。

●用法・用量を厳守して下さい。

【成分・分量】1日量（100mL）中
チアミン硝化物10mg・リボフラビンリン
酸エステルナトリウム5mg・ピリドキ
シン塩酸塩5mg・ニコチン酸アミド
20mg・無水カフェイン50mg・L-リ
ン塩酸塩100mg・タウリン1000mg・
ローヤルゼリーチンキ50mg（原生薬
換算量50mg）・ジャショウシエキス
20mg（原生薬換算量200mg）
添加物として、クエン酸・DL-リンゴ酸・
白糖・ブドウ糖・D-ソルビトール・ハチ
ミツ・安息香酸Na・パラベン・香料を含
有します。（アルコール0.2mL以下）

●本剤の服用により、尿が黄色くなる
ことがありますが、これは本剤中のリボ
フラビンリン酸エステルナトリウムによ
るもので心配ありません。

副作用救済制度
電話 0120-149-931

 協和薬品工業株式会社
岐阜県岐阜市野一色2丁目8番6号
フリーダイヤル 0120-468771

滋養強壮・肉体疲労時の栄養補給

タウリン1000mg・ジャショウシ200mg配合

1000
ASTOCAL
アストカル[®]

第3類医薬品

ローヤルゼリー
50mg
配合

【使用上の注意】

100mL

（相談すること）

次の場合は、服用を中止し、この製品を持
って医師、薬剤師又は登録販売者に相談
して下さい。

●しばらく服用しても症状がよくなりな
い場合

【保管及び取り扱上の注意】

（1）直射日光の当たらない涼しい所に保管して下
さい。（2）小児の手の届
かない所に保管して下
さい。（3）使用期限を過ぎ
た製品は服用しないで下
さい。（4）本剤は生薬を
配合していますので、ま
れに沈殿又は浮遊を生じ
ることがありますが、薬効
には変わりありませんの
で、よく振ってから服用し
て下さい。

金属：キャップ
ガラス：ビン

使用期限

製造番号

