

【効能・効果】 ●滋養強壮●虚弱体質
●肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養
障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期
などの場合の栄養補給

【用法・用量】成人(15歳以上)1日1回
1本(100mL)を服用してください。

●用法・用量を厳守してください。

【成分・分量】1日量(100mL)中
チアミン硝酸物(ビタミンB1)10mg・リ
ボフラビンリン酸エステルナトリウム(ビタ
ミンB2)5mg・ピリドキシン塩酸塩(ビタミ
ンB6)5mg・ニコチン酸アミド40mg・
無水カフェイン50mg・タウリン2000
mg・L-リシン塩酸塩100mg・ローヤ
ルゼリーチンキ50mg(原生薬換算量
50mg)・ジャショウシエキス20mg(原
生薬換算量200mg)

添加物として、クエン酸・DL-リンゴ酸・
白糖・ブドウ糖・D-ソルビトール・ハチミ
ツ・安息香酸Na・パラベン・香料を含有
します。(アルコール0.2mL以下)

●本剤の服用により、尿が黄色くなるこ
とがありますが、これは本剤中のリボフ
ラビンリン酸エステルナトリウム(ビタミン
B2)によるもので心配ありません。

副作用救済制度

電話 0120-149-931

協和薬品工業株式会社

岐阜県岐阜市野一色二丁目8番6号

お客様相談室 ☎ 058-246-8771

2000

滋養強壮 / 肉体疲労時の栄養補給

タウリン2000_{mg}

ジャショウシエキス配合

スラトミン2000

第3類医薬品

【販売名】スラトミン2000

【使用上の注意】 **相談すること**

(1)服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可
能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持っ
て医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

●皮膚：発疹 / 消化器：胃部不快感、下痢

(2)次の場合は、服用を中止し、この製品を持って医
師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

●しばらく服用しても症状が
よくなる場合

【保管及び取り扱い上の注意】

(1)直射日光の当たらない

涼しい所に保管してくださ
い。(2)小児の手の届かな
い所に保管してください。

(3)使用期限を過ぎた製品
は服用しないでください。

(4)本剤は生薬を配合して
いますので、まれに沈殿又
は浮遊を生じることがあり
ますが、薬効には変わりあ
りませんので、よく振ってか
ら服用してください。