

【効能・効果】●滋養強壮●虚弱体質
●肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養
障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期
などの場合の栄養補給

【用法・用量】成人(15歳以上)1日1
回1瓶(100mL)を服用して下さい。

●用法・用量を厳守して下さい。

【成分・分量】1日量(100mL)中
タウリン3000mg・チアミン硝化物
10mg・リボフラビンリン酸エステル
ナトリウム5mg・ピリドキシン塩酸塩
5mg・ニコチン酸アミド40mg・無水
カフェイン50mg・L-リシン塩酸塩
100mg・ローヤルゼリーチンキ
50mg(原生薬換算量50mg)・ジャシ
ョウシエキス20mg(原生薬換算量
200mg)・イカリ草流エキス0.1mL(原
生薬換算量100mg)

添加物として、白糖・クエン酸・安息香酸Na・
パラベン・香料を含有します。(アルコール
0.2mL以下)●本剤の服用により、尿
が黄色くなることがあります。これは
本剤中のリボフラビンリン酸エステルナ
トリウムによるもので心配ありません。

副作用救済制度

電話 0120-149-931



協和薬品工業株式会社
岐阜県岐阜市野一色2丁目8番6号
フリーダイヤル 0120-468771

ローヤルゼリー・イカリ草
ジャシヨウシ・タウリン3000mg配合

第2類医薬品

VITAALTO
PW

ビタアルト® PW

滋養強壮・肉体疲労時の栄養補給

【使用上の注意】

〔相談すること〕

次の場合は、服用を中止し、この製品を持
って医師、薬剤師又は登録販売者に相談
して下さい。

●しばらく服用しても症状がよくなり
ない場合

【保管及び取り扱い上の注意】

(1)直射日光の当たら
ない涼しい所に保管し
て下さい。(2)小児の
手の届かない所に保管
して下さい。(3)使用
期限を過ぎた製品は服
用しないで下さい。

(4)本剤は生薬を配合
していますので、まれに
沈殿又は浮遊を生じる
ことがありますが、薬効
には変わりありません
ので、よく振ってから服
用して下さい。

【効能・効果】●滋養強壮●虚弱体質
●肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養
障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期
などの場合の栄養補給

【用法・用量】成人(15歳以上)1日1
回1瓶(100mL)を服用して下さい。

●用法・用量を厳守して下さい。

【成分・分量】1日量(100mL)中
タウリン3000mg・チアミン硝酸物
10mg・リボフラビンリン酸エステル
ナトリウム5mg・ピリドキシン塩酸塩
5mg・ニコチン酸アミド40mg・無水
カフェイン50mg・L-リシン塩酸塩
100mg・ローヤルゼリーチンキ
50mg(原生薬換算量50mg)・ジャシ
ョウシエキス20mg(原生薬換算量
200mg)・イカリ草流エキス0.1mL(原
生薬換算量100mg)

添加物として、白糖・クエン酸・安息香酸Na・
バラベン・香料を含有します。(アルコール
0.2mL以下)●本剤の服用により、尿
が黄色くなることがありますが、これは
本剤中のリボフラビンリン酸エステルナ
トリウムによるもので心配ありません。

副作用救済制度
電話 0120-149-931



協和薬品工業株式会社
岐阜県岐阜市野一色2丁目8番6号
フリーダイヤル 0120-468771

VITALTO PW/3000

第2類医薬品 イカリ草・ローヤルゼリー・
タウリン3000mg配合

ビタアルト® PW

滋養強壮・肉体疲労時の栄養補給

【使用上の注意】

100mL

〔相談すること〕

次の場合は、服用を中止し、この製品を持
って医師、薬剤師又は登録販売者に相談
して下さい。

●しばらく服用しても症状がよくならない
場合

【保管及び取り扱い上の注意】

(1)直射日光の当たら
ない涼しい所に保管し
て下さい。(2)小児の
手の届かない所に保管
して下さい。(3)使用
期限を過ぎた製品は服
用しないで下さい。

(4)本剤は生薬を配合
していますので、まれに
沈殿又は浮遊を生じる
ことがあります。薬効
には変わりありません
ので、よく振ってから服
用して下さい。

金 属：キャップ
ガラス：ビン



使用期限

製造番号