

〔使用上の注意〕 相談すること

(1)服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

●皮膚:発疹/消化器:胃部不快感、下痢

(2)次の場合は、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

●しばらく服用しても症状がよくなる場合

〔効能・効果〕

●滋養強壮●虚弱体質●肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給

〔用法・用量〕

成人(15歳以上)1日1回1本(100mL)を服用してください。

●用法・用量を厳守してください。

〔保管及び取り扱い上の注意〕

(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。(4)本剤は生薬を配合していますので、まれに沈殿又は浮遊を生じることがありますが、薬効には変わりありませんので、よく振ってから服用してください。

副作用被害救済制度 電話:0120-149-931

協和薬品工業株式会社

岐阜県岐阜市野一色二丁目8番6号

お客様相談室 ☎ 058-246-8771

※この商品は(株)マツキヨココカラ&カンパニーのオリジナル商品です。

matsu
kiyo

3000

つらい疲れに

Vitamin-containing
Health Drugs

タウリン3000mg
+イカリソウ流エキス配合

ゲキタミンD3000

第2類医薬品

販売名:ゲキタミンD3000

〔成分・分量〕

1日量(100mL)中

チアミン硝酸物10mg・リボフラビンリン酸エステルナトリウム5mg・ピリドキシン塩酸塩6mg・ニコチン酸アミド20mg・無水カフェイン50mg・タウリン3000mg・イカリ草流エキス0.1mL(原生薬換算量100mg)

添加物として、クエン酸・白糖・安息香酸Na・パラベン・エタノール・香料を含有します。(アルコール0.3mL以下)

●本剤の服用により、尿が黄色くなる場合がありますが、これは本剤中のリボフラビンリン酸エステルナトリウムによるもので心配ありません。