【効能・効果】●滋養強壮●虚弱体質●肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給

【用法・用量】成人（15歳以上）1日1回1瓶（100mL）を服用して下さい。
●用法・用量を厳守して下さい。

【成分・分量】1日量（100mL）中チアミン硝化物10mg・リボフラビンリン酸エステルナトリウム5mg・ピリドキシン塩酸塩6mg・ニコチン酸アミド20mg・無水カフェイン50mg・タウリン3000mg・イカリ草流エキス0.1mL（原生薬換算量100mg）
添加物としてクエン酸・白糖・安息香酸Na・パラベン・エタノール・香料を含有します。（アルコール0.3mL以下）
●本剤の服用により、尿が黄色くなることがありますが、これは本剤中のリボフラビンリン酸エステルナトリウムによるもので心配ありません。

副作用救済制度
電話 0120-149-931

協和薬品工業株式会社
岐阜県岐阜市野一色2丁目8番6号
フリーダイヤル　0120-468771



【使用上の注意】
〔相談すること〕
次の場合は、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
●しばらく服用しても症状がよくならない場合

【保管及び取り扱い上の注意】
（1）直射日光の当たらない涼しい所に保管して下さい。（2）小児の手の届かない所に保管して下さい。（3）使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。
（4）本剤は生薬を配合していますので、まれに沈殿又は浮遊を生じることがありますが、薬効には変わりありませんので、よく振ってから服用して下さい。

【効能・効果】●滋養強壮●虚弱体質●肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給

【用法・用量】成人（15歳以上）1日1回1瓶（100mL）を服用して下さい。
●用法・用量を厳守して下さい。

【成分・分量】1日量（100mL）中
チアミン硝化物10mg・リボフラビンリン酸エステルナトリウム5mg・ピリドキシン塩酸塩6mg・ニコチン酸アミド20mg・無水カフェイン50mg・タウリン3000mg・イカリ草流エキス0.1mL（原生薬換算量100mg）
添加物としてクエン酸・白糖・安息香酸Na・パラベン・エタノール・香料を含有します。（アルコール0.3mL以下）
●本剤の服用により、尿が黄色くなることがありますが、これは本剤中のリボフラビンリン酸エステルナトリウムによるもので心配ありません。

副作用救済制度
電話 0120-149-931

協和薬品工業株式会社
岐阜県岐阜市野一色2丁目8番6号
フリーダイヤル　0120-468771



【使用上の注意】
〔相談すること〕
次の場合は、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
●しばらく服用しても症状がよくならない場合

【保管及び取り扱い上の注意】
（1）直射日光の当たらない涼しい所に保管して下さい。（2）小児の手の届かない所に保管して下さい。（3）使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。
（4）本剤は生薬を配合していますので、まれに沈殿又は浮遊を生じることがありますが、薬効には変わりありませんので、よく振ってから服用して下さい。

100mL