

4
9987347
202013

販売名：トッカピン100
〔使用上の注意〕
【相談すること】
しばらく服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
〔効能・効果〕
●滋養強壮●虚弱体质●肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前産後などの場合の栄養補給



滋養強壮、肉体疲労時の栄養補給

植物性生薬と動物性生薬のW処方

トッカピン100

タウリン2000mg
ニンジン600mg

(原生葉換算)

元氣

〔用法・用量〕

大人(15才以上)1日1回1瓶(100mL)を服用する。
・用法及び用量を厳守すること。

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと（誤用の原因になり品質が変わる。）。
- (4) 使用期限の過ぎた製品は使用しないこと。

100mL
製造販売元 **Kinjo**
金陽製薬株式会社
奈良県五條市住川町1420番地
TEL 0747-22-3451

第2類医薬品

ガラス：瓶、金属：キャップ

〔成分・分量〕 1日量(1瓶:100mL) 中	
タウリン	2000mg
ニンジンエキス	54mg(ニンジン600mgに相当)
ゴオウチンキ	0.2mL(ゴオウ2mgに相当)
ハンピチンキ	0.75mL(ハンピ150mgに相当)
イカリ草エキス	30mg(インヨウカク300mgに相当)
チアミン塩化物塩酸塩(ビタミンB1)	10mg
リボフラビン(ビタミンB2)	5mg
ビリドキシン塩酸塩(ビタミンB6)	6mg
ニコチン酸アミド	20mg
無水カフェイン	50mg

(アルコール含有0.6mL以下)

添加物としてクエン酸、DL-リンゴ酸、L-グルタミン酸Na、白糖、ブドウ糖果糖液糖、D-ソルビトール、安息香酸Na、バラベン、プロピレングリコール、香料、アルコール、バニリン、エチルバニリンを含有します。

- ・本剤に配合されているリボフラビンにより、尿が黄色になることがあります。
- ・生薬成分を含むため、まれに沈澱を生じることがありますが、薬効には支障ありません。

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

使用期限

Lot No.