

滋養強壮、肉体疲労時・発熱性消耗性疾患時の栄養補給

販売名:ビタグルコン内服液DII

〔成分・分量〕

1日量(1本:30mL)中
ニンジンエキス(人参)40.3mg
(ニンジン600mgに相当)、ゴオ
ウチキン(牛黄)0.2mL(ゴオウ
2mgに相当)、ロクジョウチキン
(鹿茸)0.1mL(ロクジョウ30mg
に相当)、チアミン塩化物10mg、
リボフラビンリン酸エステルナト
リウム5mg、ビリキシン塩酸塩
6mg、ニコチニンアミド20mg、
無水カフェイン50mg
(アルコール含有0.2mL以下)
添加物としてケエン酸、DL
一リンゴ酸、ハチミツ、液糖、
D-ソルビトール、L-グル
タミン酸Na、安息香酸Na、
香料、アルコール、プロピレ
ングリコール、グリセリン、
バニリン、エチルバニリン、
ビタミンEを含有します。
・本剤に配合されている
リボフラビンリン酸エ
ステルナトリウムにより、
尿が黄色になることが
あります。

・生薬成分を含むため、
まれに沈済を生じること
がありますが、薬効
には支障ありません。

〔用法・用量〕

成人(15歳以上)1日1回
1本(30mL)を服用する。
・用法及び用量を厳守す
ること。
・内服にのみ使用すること。

ビタグルコン 内服液DII

第3類医薬品

人参・牛黄・鹿茸



Kinyo
金陽製薬株式会社
奈良県五條市住川町1420番地
TEL 0747-22-3451

〔使用上の注意〕

〔相談すること〕

しばらく服用しても症状がよくな
らない場合は服用を中止し、この
製品を持って医師、薬剤師又は登
録販売者に相談すること

〔効能・効果〕

滋養強壮、虚弱体质、肉体疲労・
病中病後・食欲不振・栄養障害・
発熱性消耗性疾患・産前産後な
どの場合の栄養補給

〔保管及び取扱い上の注意〕

(1)直射日光の当たらない涼しい所に
保管すること。(2)小児の手の届か
ない所に保管すること。(3)他の容器に
入れ替えないこと(誤飲の原因にな
ったり品質が変わること)。(4)使用期限の
過ぎた製品は服用しないこと。

30mL

副作用被害救済制度

☎ 0120-149-931

111740
FSF202



アンブル:PP
ラベル:PET

使用
期限

Lot
No.