



【使用上の注意】

【相談すること】

しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【効能・効果】

●滋養強壮●虚弱体質●  
肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前産後などの場合の栄養補給

【用法・用量】

成人(15歳以上) 1日1回  
1本(30mL)を服用する。  
・用法及び用量を厳守すること。

副作用被害救済制度  
☎0120-149-931

ガラス:ビン、金属:キャップ

使用期限

Lot No.

滋養強壮  
虚弱体質

Yakuho D  
内服液

第2類医薬品

薬鳳D

ゴウチンキ  
ニンジンエキス 配合

KINYO

製造販売元  
金陽製薬株式会社  
奈良県五條市住川町1420番地  
TEL 0747-22-3451

販売名:薬鳳D

【成分・分量】1日量(1本:30mL)中  
ニンジンエキス55mg(日局ニンジン  
610.5mgに相当)、ゴウチンキ  
0.2mL(日局ゴウチンキ2mgに相当)、  
ロクジョウチンキ0.1mL(ロクジョウ  
30mgに相当)、シベットチンキ  
0.03mL(シベット3mgに相当)、日  
局タウリン300mg、日局チアミン塩  
化物塩酸塩10mg、日局リボフラビン  
2mg、日局ピリドキシン塩酸塩  
6mg、日局ニコチン酸アミド  
20mg、日局無水カフェイン50mg  
(アルコール含有0.2mL以下)

添加物としてクエン酸、DL-リンゴ  
酸、白糖、ブドウ糖果糖液糖、D-ソル  
ビトール、カラメル、安息香酸Na、パ  
ラベン、アルコール、香料、グリセリン、  
プロピレングリコール、パニコリン、  
エチルパニコリンを含有します。

- 本剤に配合されているリボフラビンにより、尿が黄色になることがあります。
- 生薬成分を含有するため、まれに吐瀉を生じることがありますが、薬効には支障ありません。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。(2) 小児の手の届かない所に保管すること。(3) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる。)。 (4) 使用期限の過ぎた製品は服用しないこと。

30mL