

第2類医薬品

滋養強壮、肉体疲労時の栄養補給

50mL

販売名:ピタグルコンエースD

【使用上の注意】【相談すること】

しばらく服用しても症状がよくなり  
ない場合は服用を中止し、この製品  
を持って医師、薬剤師又は登録販売  
者に相談すること

【効能・効果】


●滋養強壮●虚弱体質●肉体疲労・  
病中病後・食欲不振・栄養障害・  
発熱性消耗性疾患・産前産後などの  
場合の栄養補給

【用法・用量】

成人(15歳以上)1日1回1本(50mL)  
を服用する。  
・用法及び用量を厳守すること。

# ピタグルン E-SD

牛黄・人参・淫羊藿



【成分・分量】1日量(1本:50mL)中

グルクロノラクトン	300mg
ニンジンエキス(人参)	55mg
(日局ニンジン610.5mgに相当)	
ゴウチンキ(牛黄)	200μL
(日局ゴウチンキ2mgに相当)	
イカリソウエキス(淫羊藿)	30mg
(日局インヨウカク300mgに相当)	
ロクジョウチンキ	100μL
(ロクジョウ30mgに相当)	
シベットチンキ	30μL
(シベット3mgに相当)	
日局チアミン塩化物塩酸塩	10mg
日局リボフラビン	2mg
日局ピリドキシン塩酸塩	5mg
日局ニコチン酸アミド	20mg
日局無水カフェイン	50mg
(アルコール含有0.5mL以下)	

添加物としてクエン酸、DL-リンゴ酸、L-グル  
タミン酸Na、白糖、ブドウ糖果糖液糖、D-ソ  
ルビトール、安息香酸Na、パラベン、アルコー  
ル、香料、プロピレングリコール、グリセリン、バ  
ニリン、エチルパニリンを含有します。

- ・本剤に配合されているリボフラビンにより、尿が黄色になることがあります。
- ・生薬成分を含むため、まれに沈澱を生じることがありますが、薬効には支障ありません。

【保管及び取り扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になつたり品質が変わる。)
- (4) 使用期限の過ぎた製品は服用しないこと。

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931



製造販売元 **Rinyo** 金陽製薬株式会社  
奈良県五條市住川町1420番地  
Tel. 0747-22-3451

ガラス:ビン、金属:キャップ

使用期限

Lot No.