

## 第2類医薬品

〔使用上の注意〕  
【相談すること】

しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

〔効能・効果〕

●滋養強壯 ●虚弱体質 ●肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前産後などの場合の栄養補給

〔用法・用量〕

成人(15歳以上)1日1回1本(70mL)を服用する。  
・用法及び用量を厳守すること。

〔保管及び取扱いの注意〕

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。
- (2)小児の手の届かない所に保管すること。
- (3)他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4)使用期限の過ぎた製品は服用しないこと。
- (5)凍らせないこと(有効成分が結晶化する場合があります。)

〈発売元〉



株式会社 中京医薬品

愛知県半田市亀崎北浦町2-15-1

ガラス：ピン、金属：キャップ

## 滋養強壯、肉体疲労時の栄養補給

滋養強壯

ビタラスター-GX

6つの生薬

タウリン  
3000mg 配合

7つの洋薬



中京医薬品 70mL

〔成分・分量〕1日量(1本:70mL)中

ニンジンエキス55mg(人蔘610.5mgに相当)、イカリソウエキス30mg(淫羊藿300mgに相当)、ロクジョウチンキ60μL(鹿茸18mgに相当)、ショテイシエキス50mg(女貞子200mgに相当)、トチュウ抽出液200μL(杜仲200mgに相当)、シベットチンキ30μL(墨猫香3mgに相当)、タウリン3000mg、チアミン塩化物塩酸塩10mg、リボフラビン5mg、ピリドキシン塩酸塩6mg、ニコチン酸アミド20mg、無水カフェイン50mg、コンドロイチン硫酸エステルナトリウム120mg、(アルコール含有0.3mL以下)、添加物として白糖、ブドウ糖果糖液糖、D-ソルビトール、クエン酸、DL-リンゴ酸、L-グルタミン酸Na、DL-アラニン、エデト酸Ca/2Na、リンゴ果汁、安息香酸Na、パラベン、アルコール、香料、グリセリン、バニリン、エチルバニリン、安息香酸ベンジルを含有します。・本剤に配合されているリボフラビンにより、尿が黄色になることがあります。・生薬成分を含むため、まれに沈澱を生じることがありますが、薬効には支障ありません。

〔製造販売元〕金陽製薬株式会社

奈良県五條市住川町1420番地 電話:0747-22-3451

副作用被害救済制度 電話:0120-149-931

¥350+税

1028

使用期限

Lot No.