

【使用上の注意】

【相談すること】

しばらく服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【効能・効果】

●滋養強壮 ●虚弱体質 ●肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前産後などの場合の栄養補給


【用法・用量】

成人(15歳以上)1日1回1本(100mL)を服用する。  
・用法及び用量を厳守すること。

発売元

 **MIC** 株式会社 新日配薬品  
Medical Information Coordinator  
山口県下関市新堀田北町2番16号  
TEL 083-253-1807

製造販売元

 **Rinyo** 金陽製薬株式会社  
奈良県五條市住川町1420番地  
TEL 0747-22-3451

第2類医薬品

ガラス：ビン  
金属：キャップ

# タギル EX-II

# 3000

## 滋養強壮、 肉体疲労時の栄養補給

### タウリン

### インヨウカク

### ジョテイシ

## 100mL

販売名：タギルEX-II 第2類医薬品

〔成分・分量〕 1日量(1本：100mL)中

|            |                      |
|------------|----------------------|
| タウリン       | 3000mg               |
| イカリソウエキス   | 30mg(インヨウカク300mgに相当) |
| ジョテイシエキス   | 50mg(ジョテイシ200mgに相当)  |
| チアミン塩化物塩酸塩 | 10mg                 |
| リポフラビン     | 2mg                  |
| ピリドキシン塩酸塩  | 6mg                  |
| ニコチン酸アミド   | 20mg                 |
| 無水カフェイン    | 50mg                 |

(アルコール含有0.2mL以下)

添加物としてクエン酸、DL-リンゴ酸、グルコラクトン、L-グルタミン酸Na、DL-アラニン、白糖、ブドウ糖果糖液糖、D-ソルビトール、安息香酸Na、パラベン、アルコール、香料、プロピルグリコール、パニリン、エチルパニリン、グリセリン、L-メントールを含有します。

- ・本剤に配合されているリポフラビンにより、尿が黄色になることがあります。
- ・生薬成分を含むため、まれに沈澱を生じることがありますが、薬効には支障ありません。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。
- (2)小児の手の届かない所に保管すること。
- (3)他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4)使用期限の過ぎた製品は服用しないこと。

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

使用期限

Lot No.