

✂ ここからお切りください。

↓ 開封後はチャックを閉じて保存してください。

胃腸障害・疲労感・だるさ

滋養強壯

肉体疲労

レバエース



肝臓加水分解物

ウルソデオキシコール酸

60錠 第3類医薬品



✂ ここからお切りください。

↓ 開封後はチャックを閉じて保存してください。

販売名：レバ エース

第3類医薬品

△ 使用上の注意



相談すること

この説明書は服用前に必ずお読みください。

1. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状	関係部位	症状
皮膚	発疹、かゆみ、じんましん	精神神経系	頭痛
消化器	腹痛、胃部膨満感、吐き気	その他	□のかわき

2. しばらく服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【効能・効果】

滋養強壮、虚弱体質 肉体的疲労・病中病後・胃腸障害・
栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 用法・用量を厳守してください。
(2) 15歳未満の小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

【用法・用量】

次の1回量を1日3回服用してください。

年齢	1回量	年齢	1回量
成人(15歳以上)	2錠	6歳未満	服用しないでください
6歳以上 15歳未満	1錠		

【成分・分量】 1日量 (6錠中)

成分	分量
肝臓加水分解物	600mg
ジクロロ酢酸ジイソプロピルアミン	30mg
ウルソデオキシコール酸	10mg
リボフラビン (ビタミンB ₂)	5mg
ピリドキシン塩酸塩 (ビタミンB ₆)	5mg
グルコン酸カルシウム水和物	150mg

添加物として、乳糖水和物、無水リン酸水素カルシウム、合成ケイ酸アルミニウム、軽質無水ケイ酸、結晶セルロース、β-シクロデキストリン、カルメロースカルシウム、タルク、ステアリン酸マグネシウム、ヒプロメロース、白糖、酸化チタン、アラビアゴム末、ポビドン、黄色5号、赤色3号、青色1号、カルナウバロウを含む。

<成分・分量に関連する注意>

本剤の服用により尿が黄色くなるがありますが、これは本剤中のリボフラビンによるものですから心配ありません。

【保管及び取扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所にチャックを閉じて保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- 他の容器に入れ替えないでください (誤用の原因になったり品質が変わります)。
- 使用期限をすぎた製品は服用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後はなるべく早く服用してください (品質保持のため)。
- 水分が錠剤に付着しますと、表面の一部が溶けて、変色又は色むらを生じることがあります。ぬれた手で触れないでください。また、ぬれた錠剤を袋に戻すと他の錠剤にも影響を与えますので、戻さないでください。

製品のお問合せ先/お客様相談窓口

至誠堂製薬株式会社 ☎0745-62-5555

受付時間/ 10:30~15:00 (土、日、祝日を除く)



使用期限

製造番号



【発売元】株式会社 ジョヴィ
【製造販売元】至誠堂製薬株式会社

大阪府大阪市中央区南船場 4-2-4
奈良県御所市茅原 2 0 - 1

副作用被害救済制度のお問い合わせ先
(独) 医薬品医療機器総合機構
http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html
電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

版 No.2