

成分・分量 10粒(1.15g)中

ロクジョウ(鹿茸)	250mg
ニンジン末(人蔘)	400mg
サフラン(薑紅花)	30mg
トウキ末(当帰)	250mg
ダイソウエキス(大棗)	60mg
ニコチン酸アミド	50mg
ビタミンB6	20mg
添加物 テヒドロ酢酸Na、グリセリン、 カカオ、寒梅粉、タルク、アラビアゴム、 薬用炭	

用法・用量

成人(15歳以上)	1回 5粒
11歳以上15歳未満	1回 3粒
1日2回食後白湯又は清水にて服用する。	

(注意) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

製造販売元

成光薬品工業株式会社

奈良県北葛城郡広陵町大塚739

相談窓口 0745-55-0044



第3類
医薬品



効能・効果

- 滋養強壮 ○虚弱体質
- 肉体疲労・病中病後・胃腸障害・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給

注 意

- 1.直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
- 2.小児の手の届かない所に保管すること。
- 3.服用に際しては、添付文書をよく読むこと。
- 4.他の容器に入れ替えないこと。
(誤用の原因になつたり品質が変わる。)
- 5.配達期限の過ぎた製品は、服用しないこと。
副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

徳用大瓶 1200粒 ¥ 49,800+税

品名
配置期限

緯丈



詰め物
外装フィルム

改訂年月 平成二十二年九月

服用に際して、この文書を必読下さい。
又、必要な時に読めるよう大切に保管
して下さい。

品名 祿丈

第3類
医薬品

△ 使用上の注意  してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、
副作用・事故がおこりやすくなる)

十一歳未満の小児は服用しないこと。

相談すること

- 一、次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること
 - (一) 医師の治療を受けている人。
 - (二) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (三) 本人又は家族がアレルギー体质の人。
 - (四) 薬によりアレルギー症状をおこしたことがある人。
- 二、次の場合は、直ちに服用を中止し、この製品を持つて医師又は薬剤師に相談すること
 - (一) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ
消化器	恶心・嘔吐、食欲不振

- (二) しばらく服用しても症状がよくならない場合

その他の注意

- (一) 定められた用法・用量を厳守すること。

- (二) 本剤は生薬(自然界からとれる薬用の動植物)を用いた丸剤ですから、製品により形状が多少異なることがあります。が、効果には変わりありません。

【保管及び取扱い上の注意】

(一) 直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。

(二) 小児の手の届かない所に保管すること。

(三) 他の容器に入れ替えないこと。
(誤用の原因になつたり品質が
変わること。)

(四) 配置期限の過ぎた製品は服用
しないこと。

副作用被害救済制度

TEL ○一二〇・一四九・九三一

【相談窓口】

奈良県北葛城郡広陵町大塚七二九
成光薬品工業株式会社
TEL ○七四五・五五・〇〇四四



丸薬
成光
ロクジョウ