


販売名 ラヴァーレドリンク 

【成分・分量】 1本(50mL)中
リボフラビンリン酸エステルナトリウム(ビタミンB₂リン酸エステル)30mg、ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB₆)50mg、ニコチン酸アミド60mg、チアミン硝酸化物(ビタミンB₁硝酸塩)10mg、ヨクイニンエキス150mg(ヨクイニンとして1950mg)添加物としてクエン酸、dL-リンゴ酸、果糖、ブドウ糖、パラベン、プロピレングリコール、エタノール、香料を含有する。

【効能・効果】 ①次の諸症状の緩和肌あれ、にきび、口内炎、口角炎、口唇炎、舌炎、皮膚炎、湿疹、かぶれ、ただれ、目の充血、目のかゆみ、赤鼻[ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善が見られない場合は、医師又は薬剤師に相談してください。] ②次の場合のビタミンB₂の補給：肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時

【用法・用量】 成人(15歳以上)1回1本(50mL)を1日1回服用してください。(15歳未満は服用しないこと。)●用法・用量を厳守すること。
*本剤は生薬成分を配合していますので、沈殿を生じることがあります。よく振ってから服用してください。

発売元 **奥田製薬株式会社**
大阪市北区天満1丁目4番5号
お薬相談 06-6351-2100(代表)
(9:00~17:00 土日祝日を除く)

製造販売元 **中外医薬生産株式会社**
三重県伊賀市ゆめが丘7-5-5

ガラス：ピン 金属：キャップ

06 副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

肌あれ・にきび・口内炎

B₂
B₆

ビタミンB₂
ビタミンB₆ ヨクイニン 配合

ラヴァーレドリンク
第3類医薬品 50mL

〈使用上の注意〉

相談すること

1.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。○皮膚：発疹・発赤、かゆみ ○消化器：胃部不快感、胃部膨満感、食欲不振、吐き気・嘔吐 2.服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強がみられた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
○下痢 3.1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
〈保管及び取扱い上の注意〉(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。(2)小児の手の届かない所に保管すること。(3)他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。) (4)使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。
*本剤の服用により尿が黄色くなることありますが、ビタミンB₂リン酸エステルによるものですので心配ありません。

製造番号

使用期限

