

滋養強壯

天山精

V

第2類医薬品



人参

滋養強壯

天山精

V

疲れがたまって

元気がない時に

淫羊藿 菟絲子

50 mL

第2類
医薬品

△【使用上の注意】

■ 相談すること

- 1.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

- 2.しばらく服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。
- (2)小児の手の届かない所に保管すること。
- (3)他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4)使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。

本剤は生薬成分を配合していますので、沈殿を生じることがあります。よく振ってから服用してください。

副作用被害救済制度

☎ 0120-149-931

発売元

天野商事株式会社

名古屋市中区丸の内三丁目13番12号

お客様相談室 052-951-2340

製造販売元

中外医薬生産株式会社

三重県伊賀市ゆめが丘7-5-5

02TEECAM

製造番号

使用期限



ガラス：ビン
金属：キャップ



人參

滋養強壯

天山精[®]
V

疲れがたまつて

元気がない時に

淫羊藿
菟絲子

第2類医薬品

販売名:天山精-V

【成分・分量】1本(50mL)中
 トシシエキス ……………50mg
 (原生薬トシシとして500mg)
 イカリソウエキス……………100mg
 (原生薬イカリソウとして1000mg)
 ニンジンエキス……………60mg
 (原生薬ニンジンとして666mg)
 オキソアミチン末……………50mg
 (加工ダイサン末)
 チアミン硝化物……………10mg
 (ビタミンB₁硝酸塩)
 リポフラビリン酸エステルナトリウム…5mg
 (ビタミンB₂リン酸エステル)
 ビリドキシン塩酸塩……………10mg
 (ビタミンB₆)
 無水カフェイン……………50mg
 添加物:クエン酸、dl-リンゴ酸、白糖、D-ソルビトール、ハチミツ、バラベン、プロピレングリコール、エタノール、香料

【効能・効果】

- 滋養強壯○虚弱体質
- 肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前産後などの場合の栄養補給

【用法・用量】

成人(15歳以上)1回1本(50mL)を1日1回服用してください。
 ○用法・用量を厳守すること。

50
mL

第2類
医薬品



4 987006 251406

販売名:天山精-V

【成分・分量】1本(50mL)中
トシジエキス ……………50mg
(原生薬トシジとして500mg)
イカリソウエキス ……………100mg
(原生薬イカリソウとして1000mg)
ニンジンエキス ……………60mg
(原生薬ニンジンとして666mg)
オキソアミチン末 ……………50mg
(加工ダイサン末)
チアミン鹽化物(ビタミンB₁ 硫酸塩) ……10mg
リポフラビンリン酸エステルナトリウム
(ビタミンB₂リン酸エステル) ……5mg
ピリドキシン硫酸塩 ……………10mg
(ビタミンB₆)
無水カフェイン ……………50mg
添加物:クエン酸、d-リンゴ酸、白糖、D-
ソルビトール、ハチミツ、パラベン、プロ
ピレングリコール、エタノール、香料

【効能・効果】

○滋養強壮○虚弱体質○肉体的疲
勞・病中病後・食欲不振・栄養障
害・発熱性消耗性疾患・産前産
後などの場合の栄養補給

【用法・用量】

成人(15歳以上)1回1本(50mL)
を1日1回服用してください。
○用法・用量を厳守すること。



第2類医薬品

滋養強壮

天山精[®]
V

疲れがたまって
元気がない時に
50mL

発売元



天野商事株式会社
名古屋市中区丸の内三丁目13番12号

人參

淫羊藿

菟絲子

△【使用上の注意】

■相談すること

1.服用後、次の症状があらわれた場合は副
作用の可能性があるので、直ちに服用を
中止し、この製品を持って医師、薬剤師
又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

2.しばらく服用しても症状がよくなるない
場合は服用を中止し、この製品を持って
医師、薬剤師又は登録販売者に相談する
こと

【保管及び取扱い上の注意】

(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管
すること。(2)小児の手の届かない所に保
管すること。(3)他の容器に入れ替えない
こと(誤用の原因になったり品質が変わる。)
(4)使用期限を過ぎた製品は服用しない
こと。
本剤は生薬成分を配合していますので、沈
澱を生じることがあります。よく振ってから
服用してください。

O2TEELAM



製造販売元
中外医薬生産株式会社
三重県伊賀市ゆめが丘7-5-5

製造番号

使用期限