

そんな時の栄養補給
熱で食欲がない、体がだるい

発熱性消耗性疾患などの場合の栄養補給
セラシー・リコ
カンゾウエキス、ニンジンエキス、
タクリン配合 30mL

第2類医薬品

販売名:セラシー・リコ

第2類医薬品

△【使用上の注意】

[してはいけないこと]
(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる。)
長期間連用しないこと

■【相談すること】
1.次のときは服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
(1)医師の治療を受けている人。(2)高齢者。(3)次の症状のある人。
むくみ(4)次の診断を受けた人。
心臓病、高血圧、腎臓病
2.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【問合せ部位】 皮膚 発疹・発赤、かゆみ

まれてじぶんの重要な症状が起ることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、 三日バター	手足のだるさ、しづれ、つっぱり感やわざわざに加えて、 脱力感、筋肉痛がからむられ、様子に強くなる。

3.5~6日間服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持ったて医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【成分・分量】1日量 (30mL×2) 中 【作用・用法】
カツリン(アミノペチルスルホン酸) 成人(15歳以上) 1回1瓶(30mL) を1日2回
2000mg、カンゾウエキス1000mg、服用してください。服用間隔は4時間以上お
こなさい。【用法・用量】(1)1回1瓶(30mL) を1日2回(2000mg) お召し上がりください。
【保存及び取り扱い】(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。(2)小児の
手の届かない所に保管すること。(3)他の容器に入れ替えないこ
と(誤用の原因になつたり品質が変わる。)。(4)使用期限を過ぎた
製品は服用しないこと。
※本剤は生葉成分を配合していますので、沈殿を生じことがあります。
よく振ってから服用してください。

滋養強壮、虚弱体質、肉体疲労・病
中病後、食欲不振・栄養障害・発熱、副作用被訴救済制度 ☎ 0120-149-931
性消耗性疾患、産前産後などの場
合の栄養補給
ガラスビン 金属:キャップ 02RCELYA

製造販売元 中外医薬生産株式会社
三重県伊賀市ゆめか丘7-5-5

お客様相談室 : 0595-21-3200
受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)



4 987307421904

第2類医薬品

販売名:セラシー・リコ

【使用上の注意】

【してはいけないこと】

(やらない) 現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる。

長期連用しないこと

【相談すること】

医師(又は看護師)又に薬剤師に相談すること

(1)医療行為の治療を受ける人 (2)高齢者。

(3)次の症状のある人。めまい (4)次の副腎

を受ける人。心筋病、高血圧、糖尿病

又は腎臓病の人 (5)2種以上の薬剤で

作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、

この製品を持って医師、薬剤師又は看護師

に相談すること

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤・かゆみ

またに下記の重複な症状が起こることがある。

その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名前	症 状
筋肉痛	手足のむくさ、しづれ、つっぱりやこわばりに加えて、腕力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

3.5~6日間服用しても症状がよくならない

場合は服用を中止し、この製品を持って医師、

薬剤師又は看護師に相談すること

中外医薬生産株式会社
三重県伊勢市ゆめか丘7-5-5

お客様相談室：0595-21-3200
受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

第2類医薬品

風邪などで 熱がある時の 栄養補給に

セラシー・リコ

DRINK

30mL

CAINZ



【成分・分量】

1日量(30mL×2)中
タウリン(β-アミノカルボン酸) 2000mg、カン
ソクエキス 1000mg、ビリ
ンジンエキス 2600mg、ビリ
ドキシン塩酸塩(ビタミン
B6) 50mg、加糖(果糖、ボ
リジン酸Na、アルギニ酸フ
ロピレングリコールエステ
ル、ハチミン、デヒドロ酢酸
Na、タウリン、プロピレ
ングリコール、香料

【効能・効果】

滋養強壮、虚弱体質、
肉食不足、病弱者、
食事不足、消化機能障害、
常熟性消耗性疾患、
産前産後などの場合
の栄養補給に

【用法・用量】

成人(15歳以上)1回
1瓶(30mL)を1日2
回服用してください。
服用後腹痛や嘔吐等
上おいでください。
○用法・用量を厳守
すること。

【保管及び取扱い上の注意】

(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管す
ること。(2)小児の手の届かない所に保管す
ること。(3)他の容器に入れ替えないこど(誤用
の原因になった口腔薬が変わる)。(4)使用期
間は1年以内とし、開封後は速やかに服用す
ること。

*本剤は活性成分を配合しているので、沈殿

を生じることがあります。よく振ってから服用し
てください。

ガラス:ビン 金属:キャップ
01RCELCZ

#84
4 936695 731461

製造番号

使用期限