

熱で体がだるい・
食欲がない
体力消費時の
栄養補給に



30mL

第2類医薬品

ビルトン®リコレ

ビルトンリコレ

第2類医薬品

△【使用上の注意】

❌【してはいけないこと】

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる。) 長期連用しないこと。

■【相対すること】

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること (1) 医師の治療を受けている人。(2) 高齢者。(3) 次の症状のある人。 (4) 次の診断を受けた人。心臓病、高血圧、腎臓病
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
心 臓	発熱、発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、 三オキチー	手足のだるさ、しびれ、つばの感やごぼりに加えて、 筋力低下、動悸、めまい等があらわれ、急急に強くなる。

3. 5～6日連続服用しても症状がよくなるない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【成分・分量】1日量(30mL×2)中

タウリン(アミノエチルスルホン酸)

2000mg、カンゾウエキス1000mg、

ニンジンエキス60mg、ビルトキシ

ン塩酸塩(ビタミンB6)50mg、パ

ンチン140mg、添加物(果糖、

ポリリン酸Na、アルギン酸プロピル

ングリコールエステル、パラベン、

アトロピウムNa、エタノール、プロ

ピルングリコール、香料

【効能・効果】

高血圧症、虚脱状態、肉体的労、肉

体的疲労、倦怠感、栄養障害、発熱

性消耗性疾患、産前産後などの場

合の栄養補給

【用法・用量】

成人(15歳以上)1日1箱(30mL)を1日2回

服用してください。服用期間は4週間以上お

いてください。○用法・用量を厳守すること。

【保管及び取扱い上の注意】

(1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。(2) 小児の

手の届かない所に保管すること。(3) 他の容器に入れ替えないこと。

(4) 使用期限を過ぎた

製品は服用しないでください。

※本剤は生薬成分を配合していますので、沈殿を生じることがあり

ます。よく振ってから服用してください。

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

ガラス:ビン 金属:キャップ

製造販売元 中外医薬生産株式会社

三重県伊賀市ゆめが丘7-5-5

製造番号

お 客 様 相 談 室 : 0 5 9 5 - 2 1 - 3 2 0 0

受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

使用期限



02REELCH

**かぜなどで熱が出て
体がだるい、
食欲がない
そんな時の
栄養補給**

発熱性消耗性疾患などの場合の栄養補給

ビルトニコレ

カンゾウエキス、ニンジンエキス、
タウリン配合

第2類医薬品

30mL

販売名:ビルトニコレ **第2類医薬品**

△(使用上の注意)

❌(してはいけないこと)
 1) 当品と同種類の症状が悪化した時、副作用が起こりやすくなる。
 長期使用しないこと

■(相談すること) 1次の人とは服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること (1) 医師の治療を受けている人。(2) 高齢者。(3) 次の症状のある人。
 多くは(4)次の状態を受けた人。頭痛、嘔吐、発熱
 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服
 用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

服薬部位	症 状
必 要	発熱、寒熱、かゆみ
服薬の名称	症 状
熱アルドステロン症、 三オプシー	手足のたるさ、しびれ、つばの感やでわばりに加えて、 脱力感、動悸胸があらわれ、昏々に強くなる。

3ヶ月を目安服用しても症状がよくなる見えない場合は服用を中止し、この製品を
 持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【成分・分量】1日量(30mL×2)中
 カンゾウエキス(生薬抽出液) 2000mg、カンゾウエキス1000mg、
 ニンジンエキス(生薬抽出液) 2000mg、
 タウリン 50mg、
 ビタミンB₆ 10mg、
 パンテトール 50mg、
 念奴糖、
 ポリリン酸Na、
 アルギン酸プロピレ
 ン、
 シンクロナール、
 パラソル、
 テトロソル、
 エタノール、
 プロ
 ピン酸Na、
 香料

【用法・用量】 成人(15歳以上) 1回1回(30mL)を1日2回
 服用してください。服用間隔は4時間以上お
 いてください。小児は、用量を減らすこと。

【その他注意】 (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。(2) 小児の
 手の届かない所に保管すること。(3) 他の容器に入れ替えないこと
 (蓋の部分の形状が異なるため)。(4) 使用期限を過ぎた
 製品は服用しないでください。
 ※本薬は生薬成分配合していますので、次第を生じることがあ
 ります。よく振ってから服用してください。

【効能・効果】 発熱性消耗性疾患、
 発熱、
 食欲不振、
 栄養障害、
 発熱
 性消耗性疾患、
 産前産後などの場
 合の栄養補給

副作用検査済済制度 0120-149-931

ガラス:ビン 金属:キャップ 01RCELCB

製造販売元 **中外医薬生産株式会社**
 三重県伊賀市ゆめが丘7-5-5

品 名 規格 箱 数 単 位 0.5g×21×320g
 発行時間 9:00-17:00(土、日、夜日を除く) 使用期限



熱で体が
だるい、
食欲がない
そんな時の
栄養補給

発熱性消耗性疾患などの場合の栄養補給

ビルトンリコレ

カンパウエキス、ニンジンエキス、
タウリン配合

第2類医薬品

30mL

ビルトンリコレ

第2類医薬品

△【使用上の注意】

☒【してはいけないこと】

(守らなすと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる。)
長期連用しないこと

■【相対すること】

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること(1) 医師の診療を受けている人。(2) 高齢者(3) 次の症状のある人。若くは(4) 次の診療を受けた人。心臓病、高血圧、腎臓病

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製剤を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
心 臓	発熱、発赤、力弱み

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
魚アロトステロン症、 ミオパシー	手足のたるさ、しびれ、つばの嚥やこぼほに加えて、 脱力感、筋力減があらわれ、徐々に強くなる。

3. 5～6日継続服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製剤を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【成分・分量】1日量(30mL×2)中

アミノエチルスルホン酸(タウリン)

2000mg、カンパウエキス1000mg、

ニンジンエキス80mg、ビルトネシ

ン酸酢塩(ピタミンBe)50mg、パ

ンタズール30mg 添加物: 果糖、

ポ、リン酸Na、アルギン酸プロピレ

ングリコールエステル、パラベン、

アピドコリンNa、エタノール、プロ

ピレングリコール、香料

【効能・効果】

疲労強壮、虚弱体質、肉体的疲労、病

中回復、食欲不足、栄養障害、発熱

性消耗性疾患、産前産後などの場

合の栄養補給

【用法・用量】

成人(15歳以上)1日1瓶(30mL)を1日2回

服用してください。服用間隔は4時間以上お

いてください。の用法・用量を必ず守ること。

【保管及び取扱い上の注意】

(1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。(2) 小児の手の届かない所に保管すること。(3) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる。)(4) 表示の使用期限を過ぎた製剤は服用しないこと。

※本剤は生薬成分を配合していますので、沈殿を生じることがあります。よく振ってから服用してください。

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

ガラス:ビン 金属:キャップ

02RIELKW

製造販売元



中外医薬生産株式会社
三重県伊賀市ゆめが丘7-5-5

製造番号

お客様相談室: 0595-21-3200

受付時間: 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

使用期限

