

# ビルトン MAX

【成分・分量】1本(50mL)中

- トシシエキス……………50mg  
(原生薬トシシとして500mg)
  - イカリソウエキス……………100mg  
(原生薬イカリソウとして1000mg)
  - ニンジンエキス……………60mg  
(原生薬ニンジンとして666mg)
  - オキソアミチン末……………50mg  
(加工ダイサン末)
  - チアミン硝酸塩(ビタミンB<sub>1</sub>硝酸塩)…10mg
  - リポフラビンリン酸エステルナトリウム  
(ビタミンB<sub>2</sub>リン酸エステル)…5mg
  - ピリドキシン塩酸塩……………10mg  
(ビタミンB<sub>6</sub>)
  - 無水カフェイン……………50mg
- 添加物:クエン酸、dl-リンゴ酸、白糖、D-ソルビトール、ハチミツ、パラベン、プロピレングリコール、エタノール、香料

## 【効能・効果】

○滋養強壮○虚弱体質○肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前産後などの場合の栄養補給

## 【用法・用量】

成人(15歳以上)1回1本(50mL)を1日1回服用してください。  
○用法・用量を厳守すること。

滋養強壮・虚弱体質

# BILTON

## ビルトン<sup>®</sup>マックス

# MAX

第2類医薬品 50mL



製造販売元

中外医薬生産株式会社  
三重県伊賀市ゆめが丘7-5-5

## △【使用上の注意】

### ■ 相談すること

- 1.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるため、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

- 2.しばらく服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

### 【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。
- (2)小児の手の届かない所に保管すること。
- (3)他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4)使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。

本剤は生薬成分を配合していますので、洗眼を生じることがあります。よく振ってから服用してください。

02MAELCH

製造番号

使用期限

## ビルトン MAX

【成分・分量】 1本(50mL)中  
トシエキス……………50mg  
(原生薬トシとして500mg)  
イカリソウエキス……………100mg  
(原生薬イカリソウとして1000mg)  
ニンジンエキス……………60mg  
(原生薬ニンジンとして666mg)  
オキソアミチン末……………50mg  
(加工ダイサン末)  
チアミン衛化物(ビタミンB<sub>1</sub>衛酸塩)……………10mg  
リボフラビンリン酸エステルナトリウム  
(ビタミンB<sub>2</sub>リン酸エステル)……………5mg  
ピリドキシン塩酸塩……………10mg  
(ビタミンB<sub>6</sub>)  
無水カフェイン……………50mg  
添加物:クエン酸、dl-リンゴ酸、白糖、D-  
ソルビトール、ハチミツ、バラペリン、プロ  
ピレングリコール、エタノール、香料

### 【効能・効果】

○滋養強壮 ○虚弱体質 ○肉體疲  
勞・病中病後・食欲不振・栄養障害  
・発熱性消耗性疾患・産前産後な  
どの場合の栄養補給

### 【用法・用量】

成人(15歳以上)1回1本(50mL)  
を1日1回服用してください。  
○用法・用量を厳守すること。

## 滋養強壮

### 4種類の生薬成分配合

ニンジン、イカリソウ、トシエ  
キソアミチン

# ビルトン MAX

第2類医薬品 50mL

製造販売元  
中外医薬生産株式会社  
三重県伊賀市砂が丘7-5-5

### △【使用上の注意】

#### ■【相談すること】

1.服用後、次の症状があらわれた場合は  
副作用の可能性があるので、直ちに服  
用を中止し、この製品を持って医師、薬  
劑師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

2.しばらく服用しても症状がよくなり  
ない場合は服用を中止し、この製品を持  
って医師、薬劑師又は登録販売者に相  
談すること

#### 【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保  
管すること。
- (2)小児の手の届かない所に保管すること。
- (3)他の容器に入れ替えないこと(誤用  
の原因になったり品質が変わる。)
- (4)使用期限を過ぎた製品は服用しない  
こと。

本剤は生薬成分を配合していますので、沈  
殿を生じることがあります。よく振ってから  
服用してください。 02MAELMA

製造番号

使用期限

## ビルトン<sup>®</sup>MAX

【成分・分量】1本(50mL)中  
トシジエキス ……………50mg  
(原生薬トシジとして500mg)  
イカリソウエキス ……………100mg  
(原生薬イカリソウとして1000mg)  
ニンジンエキス ……………60mg  
(原生薬ニンジンとして666mg)  
オキソアミサン末 ……………50mg  
(加工ダイサン末)  
チアミン塩化物(ビタミンB<sub>1</sub>併酸塩) ……10mg  
リボフラビンリン酸エステルナトリウム  
(ビタミンB<sub>2</sub>リン酸エステル) ……5mg  
ピリドキシン塩酸塩 ……………10mg  
(ビタミンB<sub>6</sub>)  
無水カフェイン ……………50mg  
添加物:クエン酸、dL-リンゴ酸、白糖、D-  
ソルビトール、ハチミツ、パラベン、プロ  
ピレングリコール、エタノール、香料

### 【効能・効果】

○滋養強壮 ○虚弱体質 ○肉体疲  
勞・病中病後・食欲不振・栄養障  
害・発熱性消耗性疾患・産前産  
後などの場合の栄養補給

### 【用法・用量】

成人(15歳以上)1回1本(50mL)  
を1日1回服用してください。  
○用法・用量を厳守すること。

第2類医薬品 50mL

滋養強壮・虚弱体質  
ビルトン<sup>®</sup>MAX

BILTON  
MAX

製造販売元  
中外医薬生産株式会社  
三重県伊賀市ゆめが丘7-5-5

### △【使用上の注意】

#### ★相談すること

1.服用後、次の症状があらわれた場合は  
副作用の可能性があるため、直ちに服  
用を中止し、この製品を持って医師、薬  
剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

2.しばらく服用しても症状がよくなりな  
い場合は服用を中止し、この製品を持  
って医師、薬剤師又は登録販売者に相  
談すること

#### 【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保  
管すること。
- (2)小児の手の届かない所に保管すること。
- (3)他の容器に入れ替えないこと(誤用  
の原因になったり品質が変わる)。
- (4)表示の使用期限を過ぎた製品は服用し  
ないこと。

本剤は生薬成分を配合していますので、沈  
殿を生じることがあります。よく振ってから  
服用してください。

O1MAELTR

製造番号

使用期限