

発熱性消耗性疾患などの場合の栄養補給  
**キリーゼ・リコ**

開け口

第2類医薬品  
30mL×3



**【成分・分量】** 1日量(30mL×2)中  
タウリン(アミノエチルスルホン酸)2000mg、カン  
ゾウエキス10000mg、ニンジンエキス60mg、ピロ  
ドキシン塩酸塩(ビタミンB<sub>6</sub>)50mg、パンテノ  
ール30mg、添加物:果糖、ポリリン酸Na、アルギ  
ン酸プロピレングリコールエステル、パラベン、  
テヒドロ酢酸Na、エタノール、プロピレングリ  
コール、香料

**【効能・効果】**  
滋養強壮、虚弱体質、肉疲労・病中病後・食  
欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前産  
後などの場合の栄養補給

**【用法・用量】**  
成人(15歳以上) 1回1瓶(30mL)を1日2  
回服用してください。  
服用間隔は4時間以上おいてください。  
○用法・用量を厳守すること。

**【保管及び取扱い上の注意】**  
(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。(2)  
小児の手の届かない所に保管すること。(3)他の容器に  
入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる。)  
(4)使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。  
※本剤は生薬成分を配合していますので、沈殿を生じる  
ことがあります。よく振ってから服用してください。

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

お客様相談室：0595-21-3200  
受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元 中外医薬生産株式会社  
三重県伊賀市ゆめが丘7-5-5

▲使用上の注意

⊗してはいけないこと  
(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる。)  
長期連用しないこと

▲相談すること

- 1.次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること  
(1)医師の治療を受けている人、(2)高齢者 (3)次の症状のある人、  
おくみ (4)次の診断を受けた人。心臓病、高血圧、腎臓病
- 2.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに  
服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに  
医師の診察を受けること。

症状の名称	症状
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つばり感やこわ ばりに加えて、脱力感、筋内痛があらわれ、 徐々に強くなる。

3.5~6日間服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この  
製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

製造番号  
使用期限

0 1 2 4 8  
00194896

発熱性消耗性疾患などの場合の栄養補給




第2類医薬品

30mL×3

熱で体がだるい  
食欲がない

カンゾウエキス  
ニンジンエキス  
タウリン配合

**キリーゼ・リコ**



発熱性消耗性疾患などの場合の栄養補給

熱で体がだるい

食欲がない

そんな時の  
栄養補給

カンゾウエキス  
ニンジンエキス  
タウリン配合

第2類医薬品  
30mL×3

**キリーゼ・リコ**



4 987307 421607

紙箱

ガラス：ビン  
金 属：キャップ

01KJECVV

発熱性消耗性疾患などの場合

の栄養補給 **第2類医薬品**

**熱で体が  
だるい**

**食欲がない**

そんな時の

**栄養補給**

**キリージェリコ**

**30mL**

カンゾウエキス

ニンジンエキス

タウリン配合

キリージェリコ

**第2類医薬品**

△【使用上の注意】

☒【してはいけないこと】

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる。)  
長期連用しないこと

■【相談すること】

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること  
(1) 医師の治療を受けている人。(2) 高齢者 (3) 次の症状のある人、むくみ (4) 次の診断を受けた人。心臓病、高血圧、腎臓病  
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
症 状	発熱、発赤、かゆみ
症 状	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、三才1才以下
症 状	腕力減、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

また1に下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
角アルドステロン症	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、三才1才以下

3. 5～6日間服用しても症状がよくなる見えない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【成分・分量】1日量(30mL×2)中  
タウリン(アミノエチルスルホン酸)  
2000mg、カンゾウエキス1000mg、  
ニンジンエキス60mg、ビリンゲン  
塩酸塩(ビタミンB<sub>6</sub>)50mg、パ  
ンチン酸Na、添加物: 塩酸、  
ポリリン酸Na、アルギン酸プロピル、  
ソルビトール、エタノール、プロ  
ピレノール、香料

【効能・効果】

滋養補給、虚部体質、肉体的疲労、病  
中回復、食欲不振、栄養障害、発熱  
性消耗性疾患、産前産後などの場  
合の栄養補給

製造販売元



中外医薬生産株式会社  
三重県伊賀市ゆめが丘7-5-5

お客様相談室

0595-21-3200

受付時間

9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

【用法・用量】

成人(15歳以上)1回1瓶(30mL)を1日2回  
服用してください。服用期間は4週間以上お  
いてください。(用法・用量)欄を必ず守ること。

【保存及び取扱い上の注意】

(1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。(2) 小児の  
手の届かない所に保管すること。(3) 他の容器に入れ替えないこ  
と(誤用の原因になったり品質が変わる。)。 (4) 使用期限を過ぎた  
製品は服用しないこと。  
※本剤は生薬成分を配合していますので、沈殿を生じることがあり  
ます。よく振ってから服用してください。

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

ガラス:ビン 金属:キャップ

01KJELVV

製造番号

使用期限



