

キリージェ・リコ 第2類医薬品

かぜなどの熱で
体がだるい
食欲がない

【成分・分量】 1日量(30mL×2)中
クワリタマキエキス(抽出液)200mg、カ
リアセキ1000mg、ニンジンスキ100mg、サ
トキシゲラジタン50mg、リトセチル
30mg、ステアリン酸、ポリアクリル酸、
ロソクワコーム、ポリマー、(イ)水、元
ニシニシ、ステアリン酸、ポリアクリル酸、香料

【効能・効果】
滋養強壮、虚弱体質、肉体重減少、病中病
後、食欲不振、栄養障害、慢性的消耗性
疾患、発熱後後などの場合の栄養補助

【用法・用量】
成人(15歳以上)1日1回(30mL)を
1日の回服用してください。服用期間
は4週間以上おこなって下さい。
○用法・用量を遵守すること。

【保管及び取扱い上の注意】
(1)直射日光が当たらない涼しい所に保管す
ること。(2)1回分の量を取り出し、開封後
の湿度により品質が変わる。(3)使用期
間を過ぎた製品は服用しないでください。
本剤は生薬が配合されており、服用後、濃縮が生
じることがあります。よく振ってからお服用ください。

【特別表示】
天野商事株式会社
名古屋市中区栄5丁目3番1号
電話 052-951-2325
中外医薬生産株式会社
三浦県伊賀市ゆめが丘7-6-5

△使用上の注意
⊗【してはいけないこと】
(お薬名)と類似の成分が含むため、副作用が起ころ
うことがある。長期連続服用しないこと。
■【相対すること】
1. 次のような服用時に注意、薬剤又は食物併用時に注意すること
(1)胃腸の活動を遅くしている人、(2)高齢者(3)次の成分の含有
量が高くなる(4)次の成分がアレルギーの原因となる
2. 服用時、次の成分がアレルギー反応の原因となる可能性がある
ため、事前に医師を相談し、この薬品を持って医師、薬剤師又は登
録薬剤師に相談すること

薬品名	注 意 点
皮膚病	発疹、発赤、かゆみ

まれに下記のような副作用が起ることがある。その場合は必ず
医師の診察を受けよう。

薬品名	注 意 点
他のアレルギー	アレルギー反応、アレルギー反応、アレルギー反応

3. 6ヶ月以上服用しても効果がよくならない場合は医師を相談し、
この薬品を持って医師、薬剤師又は登録薬剤師に相談すること

副作用検査実施回数 ★ 0120-149-931
ガラス：ビン 金属：キャップ 01KJELAM

製造番号	
使用期限	

4 987006 250829

キリージェ・リコ 第2類医薬品 **30mL**