

滋養強壯剤

ローヤル メチビタンD

第2類医薬品

P-15B-80

滋養強壯剤

ローヤル メチビタンD



ロクジョウ(鹿茸)

ゴオウ(牛黄)

ローヤルゼリー

人參・黄精

淫羊藿・何首烏

⚠ 使用上の注意



〔相談すること〕

しばらく服用しても症状がよくなり
ならない場合は服用を中止し、
この製品を持って医師、薬剤師
又は登録販売者に相談してくだ
さい

〔効能・効果〕

滋養強壯、虚弱体質、肉体疲労・病中
病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消
耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の
栄養補給

〔用法・用量〕

成人(15才以上) 1回1びん(50mL)
を1日1回服用する。

※15才未満は服用しないでください。

〔成分・分量〕1日量(1びん・50mL)中

ローヤルゼリーチンキ(300mg) 300mg
ロクジョウチンキ(120mg) …0.4mL
ゴオウチンキ(2mg) ……0.2mL
ニンジンエキス(1,050mg) 72.4mg
インヨウカク流エキス(800mg) 0.8mL
オウセイ流エキス(1,000mg) …1mL
カシュウエキス(300mg) ……30mg
チアミン塩化物塩酸塩 ……10mg
リボフラビン ……4mg
ピリドキシン塩酸塩 ……20mg
ニコチン酸アミド ……30mg
無水カフェイン ……50mg

〈アルコール1mL以下〉

()内は原生薬換算量
添加物として白糖、クエン酸水和物、
安息香酸ナトリウム、香料を含有し
ます。

副作用被害救済制度の問合せ先
電話 0120-149-931

第2類医薬品

50mL

製造販売元 合名会社 東宝製薬
岐阜市沖ノ橋町3丁目45番地

滋養強壯剤



第2類医薬品

〔保管及び取扱い上の注意〕

1. 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
2. 小児の手の届かない所に保管してください。
3. 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
4. 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
5. 本剤は生薬成分を含むため、沈殿物などを生じることがありますが、品質には影響ありませんのでよく振ってお飲みください。

ローヤル メチビタンD

本剤について、何かお気づきの点がございましたら、
お買い求めのお店又は下記までご連絡くださいますよ
うお願い申し上げます。

合名会社 東宝製薬

TEL:058-251-6668(代表)

受付時間 午前10:00～午後4:00(土・日・祝日を除く)

製造番号

使用期限



4

955103 015023