

肝臓加水分解物配合の
滋養強壯剤

ビイレバー
ゴールド
プラス

クコシ流エキス・ハゲキテン流エキス

V-LEBERGOLD

PLUS

50mL

第2類医薬品

ビイレバーゴールドプラス

〈成分・分量〉1日量(50mL)中
肝臓加水分解物500mg タウリン1500mg
塩化カルニチン(カルニチン塩化物)100mg
ニコチン酸アミド30mg リポフラビンリン酸エ
ステルナトリウム(ビタミンB2)6mg シクロロ
酢酸ジイソプロピルアミン20mg クコシ流エキ
ス0.3mL(原生薬換算量300mg) ハゲキテン
流エキス0.3mL(原生薬換算量300mg)
添加物としてクエン酸、エタノール、プロピレングリコ
ール、安息香酸Na、トメントール、香料、白糖、果糖、ポピ
ドン、カラメルを含有する。(アルコール0.8mL以下)

〈成分・分量に関連する注意〉ビタミンB2に
より尿が黄色になることがあります。

〈用法・用量〉大人(15才以上)1日1回、1回
1本(50mL)を服用して下さい。15才未満
は服用しないで下さい。

〈用法・用量に関連する注意〉定められた用
法・用量を厳守して下さい。

〈使用上の注意〉**相談すること** 1.次の人は
服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下
さい。医師の治療を受けている人。2.服用後、次の
症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この商品を持って医
師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	胃部不快感、下痢

3.しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この商品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

〈効能・効果〉滋養強壯。虚弱体
質。肉体疲労・病中病後・胃腸障
害・栄養障害・発熱性消耗性疾患・
妊娠授乳期などの場合の栄養補給。

〈保管及び取扱い上の注意〉1.直射
日光の当たらない涼しい所に保管し
て下さい。2.小児の手の届かない所
に保管して下さい。3.他の容器に入
れ替えしないで下さい。(誤用の原因
になったり品質が変わります。)4.
使用期限を過ぎた商品は服用しな
いで下さい。5.開封後はすぐに服用
して下さい。6.天然物を配合している
ため、味やおいさが多少異なること
があります。7.まれに沈でんを生じ
ることがありますが、薬効には変わ
りありません。よく振ってから服用
して下さい。

ガラス：瓶 金属：キャップ S01

副作用被害救済制度 電話：0120-149-931

製造販売元 H295S

日新製薬株式会社

〒528-0013 滋賀県甲賀市水口町宮の前2-62

消費者相談窓口 電話 0748-62-4163

受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

製造番号

使用期限

