

服用に際して、この添付文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

# プラセンタ製剤

# オリヂンP糖衣錠

第2類医薬品

オリヂンP糖衣錠は、胎盤を化学的に処理してえられる加水分解物と、乾燥させた微粉末の混合物にビタミンB1類(チアミンジスルフィド)を加え服用を容易にした製剤であります。

豊富な蛋白質と吸収され易い各種アミノ酸、それにビタミンB1類を含んでおり、滋養強壯、肉体疲労時の栄養補給などにすぐれた効果をあらわします。

## 使用上の注意

### 相談すること

- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	かゆみ、発疹
そ の 他	生理異常




- しばらく服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

## 効 能

15才以上 滋養強壯、虚弱体質、肉体疲労・病中病後・胃腸障害・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前産後などの場合の栄養補給。

5才～14才 滋養強壯、虚弱体質、病中病後・胃腸障害・栄養障害・発熱性消耗性疾患などの場合の栄養補給、偏食児・幼小児の発育期などの栄養補給。

## 用法・用量

年齢	15才以上	11才以上15才未満	5才以上11才未満	5才未満
1回量	3錠 	2錠 	1錠 	服用させないこと 
服用回数	1日3回			

裏面もお読みください

## 用法・用量に関連する注意

- 定められた用法・用量を守ってください。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- 本剤は5才未満の乳幼児に服用させないでください。

## PTP包装の場合の錠剤の取り出し方



突き出た透明な部分を指先でアルミ箔の方へ押し、アルミ箔が破れて錠剤が出てきます。

誤って、そのまま飲み込んだりすると、食道粘膜に突き刺さる等、思わぬ事故につながります。

## 成分・分量

本品9錠(1日量)中

胎盤加水分解物	0.54mL
胎盤乾燥微粉末	750mg
チアミンジスルフィド	18mg

添加物として乳糖、セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、無水ケイ酸、ステアリン酸Mg、アラビアゴム、ゼラチン、白糖、マクロゴール、タルク、炭酸Ca、黄色5号、赤色3号、カルナウバロウを含む。

## 保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。  
(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- 箱に「開封年月日」を記入してください。  
添付文書は、箱に入れたまま保管してください。
- 使用期限をすぎた製品は服用しないでください。

日々の健康は薬だけではなく、日々の養生が大切な要因となります。規則正しい生活を守るようにしてください。

## お問い合わせ先

ビタエックス薬品工業株式会社 お客様相談室  
電 話：075(691)1671(代表)  
受付時間：9時から17時まで(土、日、祝日を除く)

製造販売元 **ビタエックス薬品工業株式会社**  
京都市伏見区竹田向代町7番地