

〔使用上の注意〕

【相談すること】

1.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

| 関係部位 | 症 状 |
|------|--------|
| 皮膚 | かゆみ、発疹 |
| その他 | 生理異常 |

2.しばらく服用しても症状がよくなる場合、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

〔成分・分量〕

本品50mL(1日量)中

胎盤加水分解物 1.5mL
 チアミン硝酸物 5mg
 リポフラビンリン酸エステルナトリウム 6.85mg
 (リポフラビンとして5mg)
 ピリドキシン塩酸塩 5mg
 ニコチン酸アミド 20mg
 無水カフェイン 50mg

[アルコール0.15mL以下]

添加物としてクエン酸、DL-リンゴ酸、果糖、ブドウ糖、パラベン、香料を含む。

製造販売元

ビタエクス薬品工業株式会社

京都市伏見区竹田向代町7番地

お問い合わせ先 電話 075(691)1671(代表)

滋養強壯 虚弱体質

PLACEN



プラセンタ製剤

プラセンVX

PLACENTA

第2類医薬品 50mL

〔効能・効果〕

滋養強壯、虚弱体質、肉体疲労・病後の体力低下・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給。

〔用法・用量〕

大人1日1回1瓶(50mL)を服用してください。

●定められた用法・用量を守ってください。

●本剤は沈澱を生ずることがありますが効果には支障ありません。よく振ってご服用ください。

〔保管及び取扱い上の注意〕

(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。

(2)小児の手の届かない所に保管してください。

(3)使用期限をすぎた製品は服用しないでください。

副作用被害救済制度 電話:0120-149-931

ガラス:ビン 金属:キャップ

使用
期限

製造
番号