

施君力内服液

[成分・分量] 1日量(50mL)中
 リボフラビン 2mg
 ピリドキシン塩酸塩 10mg
 ニコチニン酸アミド 30mg
 無水カフェイン 50mg
 タウリン 500mg
 コウジン流エキス 1,200μL
 (原生葉 1,200mg)
 インヨウカクエキス 50mg
 (原生葉 500mg)
 ゴオウチンキ 100μL
 (原生葉 1mg)
 ロクジョウチンキ 50μL
 (原生葉 15mg)
 オウセイ流エキス 250μL
 (原生葉 250mg)
 クコシ流エキス 200μL
 (原生葉 200mg)
 ジャショウシエキス 20mg
 (原生葉 200mg)
 添加物としてクエン酸、クエン酸Na、ブドウ糖果糖液糖、白糖、D-ソルビトール、安息香酸Na、プロピレングリコール、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、カラメル、香料を含有する。
 (アルコール0.6mL以下)

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

発売元

協和薬品工業株式会社

営業本部:岐阜県岐阜市野一色2丁目8番6号

問い合わせ先 ☎ 0120-468771

製造販売元

萬金薬品工業株式会社

奈良県高市郡明日香村野口317

滋養強壮

虚弱体质

淫羊藿・枸杞子
黄精



施君力

紅参

コウジン

鹿茸牛黃

(使用上の注意)

相談すること

しばらく服用しても症状がよくならない場合は、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

(効能・効果)

滋養強壮、虚弱体质、肉体疲労・病中病後・胃腸障害・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給

(用法・用量)

成人(15才以上)1日1回1本(50mL)を服用する。

(保管及び取扱い上の注意)

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管して下さい。
- (2)小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3)使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

*本剤は生薬を配合していますので、まれに沈殿を生じることがあります。薬効には変わりありません。よく振ってから服用して下さい。

第2類医薬品